

# Frupica® SC

## Bredverkande svampmedel till jordgubbar.

Effektivt gråmögelmedel med god sidoeffekt mot mjöldagg och svartfläcksjuka

Både kontaktverkande och translaminar effekt



## Allmän information

<b>Användningsområde</b>	
Mot svampangrepp i odlingar av jordgubbar på friland. Behandling får ej ske senare än 7 dagar före skörd. All annan användning är otillåten.	
<b>Registreringsnr.</b>	4781
<b>Verksam beståndsdel</b>	Mepanipyrim 440 g/l
<b>Behörighetsklass</b>	2 L
<b>Förpackning</b>	10 x 1 l, 4 x 5 l
<b>Lagring</b>	Torr och svalt. Undvik frost
<b>Tillverkare</b>	Kumiai Chemical Industry Co. Ltd., Japan

Den verksamma beståndsdel i Frupica SC, mepanipyrim, tillhör den kemiska gruppen anilinopyrimidiner, med mycket god effekt mot gråmögel i jordgubbar. Frupica SC har dessutom en god effekt mot mjöldagg och svartfläcksjuka vid användning i den högre rekommenderade dosen.

Frupica är kontaktverkande och har även translaminar verkan (god inträngning i plantan). Detta innebär att Frupica både har en förebyggande samt även en viss kurativ effekt mot gråmögel svampen.

## Användning

Frupica SC ska användas förebyggande mot gråmögel och mjöldagg. Första behandlingen mot gråmögel görs i början av blomningen (5–10 % utslagna blommor). Vid användning i mjöldaggskänsliga jordgubbssorter ska första behandlingen göras strax före blom.

För att undvika resistensproblem ska Frupica SC användas i ett behandlingsprogram tillsammans med andra svampmedel med annorlunda verkningsmekanism. Använd inte Frupica mer än två gånger i samma behandlingsprogram.

**Dos** 0,8–0,9 l/ha. Den högre dosen är nödvändig för god mjöldaggseffekt.

**Vattenmängd** 500–1000 l/ha.

**Sprutteknik** Frupica kan användas med vanlig bredspruta. En god täckning av behandlade växtdelar är nödvändig för ett bra resultat. Behandla ej i starkt solsken.

## Planttolerans

Frupica SC har provats på ett stort antal olika sorter utan problem. Frupica kan användas på jordgubbsplantans samtliga utvecklingsstadier (Observera dock karenstiden).

## Rengöring av spruta

Sprutan sköljs med vatten 3 gånger och sköljvattnet sprutas ut på den behandlade arealen. Rengör ej sprutan i närheten av sjö eller vattendrag.

## Varningstext

Misstänks kunna ge cancer. Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Ät inte eller drick inte under hanteringen. Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar. Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

**Särskilda miljörisiker** Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/säkerhetsdatablad.

För att begränsa riskerna för omgivande miljö ska de anvisningar iakttagas som framgår av Kemikalieinspektionens allmänna råd 97:3 och den hjälpredda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd som hör till Naturvårdsverkets föreskrifter (SNSF 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel.

