

Rizolex® 50 SC

RIZOLEX 50 SC är ett kontaktverkande medel mot vissa jord- och utsädesburna svampsjukdomar.

God effekt på groddbränna, lackskorv och filtsjuka

Både förebyggande och kurativ effekt



Allmän information

Användningsområde

Mot svampangrepp på potatisutsäde genom betning i samband med sättning eller utsortering från lagerhus. Mot utvintringssvampar i odlingar av höstsäd. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.

| | |
|---------------------|---|
| Registreringsnummer | 3823 |
| Förpackning | 1 l |
| Verksam beståndsdel | Tolklofosmetyl 500 g/l |
| Lagring | Torr, svalt och frostfritt i väl tillsluten originalförpackning |
| Tillverkare | Sumitomo Chemicals |

Rizolex 50 SC är vattenbaserat och speciellt formulerat för betning i samband med sättning.

Vi rekommenderar att ca 100 dagar bör förflyta mellan behandling och upptagning.

Rizolex 50 SC har en mycket god effekt på alla typer av Rhizoctonia solani som orsakar groddbränna, filtsjuka och lackskorv på potatis. För optimal effekt krävs en god fördelning på alla knölna.

Användning

Betning av potatisutsäde (sättpotatis)

Rizolex 50 SC har speciellt god effekt på lackskorv, groddbränna och filtsjuka. Rizolex 50 SC verkar såväl förebyggande som kurativt. Potatisen behandlas i samband med sättningen. Detta sker med sprayning på ett rullband eller på sättaren med speciellt anpassad sprutningsanordning med 2 stycken sprutmunstycken för varje rad. Det är viktigt att knölna täcks ordentligt av sprutvätska. Blanda med 2–3 l vatten /ton potatisutsäde.

OBS Knölna skall vara fria från jord vid behandlingen. Behandla inte förgrodda potatis.

Dosering

0,2–0,3 l Rizolex 50 SC per ton potatisutsäde.

Vattenmängd

Rizolex 50 SC är lätt blandbart med vatten men kräver en viss omrörning. En mindre mängd returpulvetska är fullt tillräck-

ligt om den spolas in på botten av tanken. Vattenmängden bör helst inte överstiga 2–3 l vatten/ton potatisutsäde.

Rizolex 50 SC kan med fördel användas outspädd med lämplig utrustning. Skall vatten tillsättas bör vattenmängden vara 2–3 l/ton potatisutsäde.

Utvintringssvampar i höstsäd

Rizolex 50 SC har främst effekt mot trådklubba. Behandlingen skall ske under hösten innan frost och snö.

Dosering

1,0–1,5 l/ha, vattenmängd 200 l/ha. Observera att Rizolex 50 SC inte har någon effekt mot snömögel.

Tillredning av sprutvätska

Fyll tanken med 3/4 med vatten. Starta omrörningen. Tillsätt därefter 50 SC. Fyll sedan på resterande mängd vatten.

Varningstext

Undvik kontakt med huden. Använd lämpliga skyddshandskar. Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad.

Särskilda miljörisker

Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. Rengör ej sprututrustning i närheten av vattendrag/Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.