

Select®

Select användes mot ett stort antal gräsogräs i en mängd olika tvåhjärtbladiga grödor.

Bredverkande gräsogräspreparat med effekt på gröearter

Låga doser ger enkel hantering

Allmän information

Användningsområde

Mot gräsogräs i odlingar av jordgubbar, lin för teknisk användning och betor, klöver, potatis, morötter, kepalök, raps, rybs, rödsvingel, ärter samt i skogsplantskolor och skogsplanteringar. Behandling av jordgubbar och kepalök får ej ske senare än 40 dagar före skörd och morötter inte senare än 60 dagar före skörd. Behandling av betor och potatis får ej ske senare än 60 respektive 35 dagar före skörd, ärter före 2-nodstadiet, lin före blomning samt raps och rybs före begynnande knoppstadie. Höstbehandling av klöver, raps och rybs får ej ske senare än 1 november. All annan användning är otillåten.

Registreringsnr. 4376

Verksam beståndsdel Kletodim 240 g/l. Innehåller även Lacknafta (aromhalt >95 %, kokpunktsintervall 165–290°C) 660 g/l

Behörighetsklass 2 L

Förpackning 3 l

Lagring Frostfritt

Tillverkare Arysta

Select används alltid tillsammans med penetreringsolja (Renol). Oljan blandas i samma mängdförhållande som Select (t ex. 0,5 l Select + 0,5 l Renol/ha).

Vattenmängd 100–200 l/ha, 300–400 l/ha i jordgubbar och skogsplantskolor.

Tillredning Fyll sprutan till $\frac{3}{4}$ med vatten. Tillsätt därefter Select och Renol under omrörning och fyll på resten av vattnet. Tillredd sprutvätska skall sprutas ut omedelbart.

Select kan blandas med Butisan Top, Goltix, fenmediphamprodukter, Matrigon, vattenbaserade pyretrorider, mangan och bor.

Om en blandning sker med Goltix bör man vara uppmärksam på att effekten av Select på kvickrot kan reduceras, varvid tillverkaren rekommenderar att istället hålla ett intervall på 3–5 dagar efter det att dessa produkter och andra ogräsmedel har används för att få ut full effekt av Select på gräsogräsen.

Rengöring Använd alltid en väl rengjord spruta. Omedelbart före och efter en behandling med Select rengörs hela sprutan, inklusive tank, ledningar och ramp.

Rengör tanken med vatten och det rekommenderade tankrengöringsmedlet All Clear Extra enligt rekommendationerna. Sköljvattnet sprutas ut över redan Selectbehandlad gröda.

Mekanisk behandling får ej utföras precis innan en behandling med Select eller förrän ca två veckor efter en Select behandling då kvickroten har börjat vissnat ned.



Vid dubbelbehandlingar kan ibland påverkan i form av tillväxthämningar och försenad blomning ske på grödan. Risken är störst vid sena behandlingar.

Ingen effekt på ej uppkommen flyghavre.

Användning

Potatis, socker-, foder- och rödbetor

Behandling av sockerbetor, foderbetor och rödbetor får ej ske senare än 60 dagar innan skörd. Potatis får ej behandlas senare än 35 dagar innan skörd.



Kvickrot

Tidpunkt Kvickroten skall ha utvecklats minst 3 blad. Vid sen behandling (max 5 blad), eller vid torkstress, väljs alltid den högre dosen. Blasten får inte täcka gräsogräsen som skall behandlas.

Ogräs	Dos/ha
Kvickrot (engångsbehandling)	0,75–1,0 l Select + 0,75–1,0 l Renol
Kvickrot (delad behandling)	0,5 l Select + 0,5 l Renol + 0,5 l Select + 0,5 l Renol (3 veckor efter första behandlingen)

Vid kraftig förekomst av kvickrot kan delad dos vara att föredra. Första behandlingen utförs när kvickroten har 3–5 blad. Nästa behandling utförs 3 veckor senare (se tabell).

Ettåriga gräsogräs

Vitgröe, kärrgröe, ängsgröe, kärrkavle, renkavle, rödsvingel, timotej, ängsvingel, rajgräs, åkerven, luddlost, sandlost och flyghavre.

OBS ingen effekt på ej uppkommen flyghavre.

Tidpunkt När gräsen normalt har 3–5 blad. Den lägre dosen används när gräsen har 1–3 blad.

Ogräs	Dos/ha
Vitgröe, övriga gräs	0,3–0,5 l Select + 0,3–0,5 l Renol
Flyghavre	0,3–0,5 l Select + 0,3–0,5 l Renol

Våroljevaxter

Behandling av vårraps och vårrybs sker före begynnande knoppstadium. Den rekommenderade dosen mot kvickrot ger en fullgod effekt under växtsäsongen.

Ogräs	Dos/ha
Kvickrot, spillsäd, ettåriga gräsogräs såsom Vitgröe, kärrgröe, ängsgröe, kärrkavle, renkavle, rödsvingel, timotej, ängsvingel, rajgräs, åkerven, luddlost, sandlost, och flyghavre.	0,3–0,35 l Select + 0,3–0,35 l Renol

Höstoljevaxter

Behandling av höstoljevaxter ska göras före begynnande knoppstadium. Den rekommenderade dosen mot kvickrot ger fullgod effekt under växtsäsongen.

Effekten mot vitgröe, kärrgröe, ängsgröe, kärrkavle, renkavle, rödsvingel, timotej, ängsvingel, rajgräs, åkerven, luddlost, sandlost, och flyghavre.

OBS ingen effekt på ej uppkommen flyghavre.

Tidpunkt på hösten

När gräsen har utvecklat 3–5 blad. Senaste behandlingstidpunkt är 1 november.

Tidpunkt på våren

När nattfrost har upphört och tillväxten har börjat. Behandling ska göras före begynnande knoppstadium. Den lägre dosen kan användas när gräsen har 1–3 blad.

Ogräs	Dos/ha
Kvickrot	0,4 l Select + 0,4 l Renol
Spillsäd, ettåriga gräsogräs såsom vitgröe, kärrgröe, ängsgröe, kärrkavle, renkavle, rödsvingel, timotej, ängsvingel, rajgräs, åkerven, luddlost, sandlost, och flyghavre.	0,3 l–0,4 l Select + 0,3–0,4 l Renol

Lin och ärter

Behandling av lin före blomning och ärter får behandlas före 2-nodstadiet. Ärter kan ibland bli mörkt grönfärgade efter behandling.

Ogräs	Dos/ha
Kvickrot	0,5 l Select + 0,5 l Renol
Spillsäd, ettåriga gräsogräs såsom vitgröe, kärrgröe, ängsgröe, kärrkavle, renkavle, rödsvingel, timotej, ängsvingel, rajgräs, åkerven, luddlost, sandlost, och flyghavre.	0,3 l–0,5 l Select + 0,3 l–0,5 l Renol
OBS Koncentrationen Renol får ej överstiga 0,5 % i ärter	

Klöverfröodling

Klövern får behandlas fram till begynnande blomning.

Tidpunkt Kvickroten skall ha 3–5 blad.

Vårbehandling fram till blomning.

Höstbehandling fram till 1 november.

Ogräs	Dos/ha
Kvickrot Denna delade behandling ger bäst resultat mot etablerad kvickrot.	0,5 l Select + 0,5 l Renol På hösten. 0,5 l Select + 0,5 l Renol På våren. Innan blomning
Kvickrot Engångsbehandling	0,75–1,0 l Select + 0,75–1,0 l Renol På våren. Använd den högre dosen om kvickroten har mer än 5 blad.
Spillsäd	0,3 l–0,5 l Select + 0,3 l–0,5 l Renol

Ettåriga gräsogräs

Vitgröe, kärrgröe, ängsgröe, kärrkavle, renkavle, rödsvingel, timotej, ängsvingel, rajgräs, åkerven, luddlost, sandlost, och flyghavre.

OBS ingen effekt på ej uppkommen flyghavre.

Tidpunkt När gräsen normalt har 3–5 blad. Den lägre dosen används när gräsen har 1–3 blad.

Vårbehandling fram till blomning.

Höstbehandling fram till 1 november.

Ogräs	Dos/ha
Vitgröe, övriga gräs	0,3–0,5 l Select + 0,3–0,5 l Renol
Flyghavre	0,3–0,5 l Select + 0,3–0,5 l Renol

Jordgubbar

Behandling på våren Fram tills jordgubbarna börjat få knopp på skaft.

Behandling på hösten Från avslutad skörd fram till mitten av november.

Karenstid Ej senare än 40 dagar före skörd.

Tidpunkt Kvickroten skall ha 3–5 blad.

Kvickrot, spillsäd, vitgröe, kärrgröe, ängsgröe, kärrkavle, renkavle, rödsvingel, timotej, ängsvingel, rajgräs, luddlost, sandlost och flyghavre.

Ogräs	Dos/ha
Kvickrot, spillsäd (delad behandling)	0,4 l Select + 0,4 l Renol + 0,4 l Select + 0,4 l Renol (3 veckor efter första behandling)
Vitgröe som har bildat vippa (fröställning) (delad behandling)	0,4 l Select + 0,4 l Renol + 0,4 l Select + 0,4 l Renol (3 veckor efter första behandling)
Vitgröe, övriga gräs	0,3–0,5 l Select + 0,3–0,5 l Renol

En upprepad behandling med Select + Renol ger den bästa effekten på kvickrot, spillsäd och vitgröe som bildat ax (fröställning). Första behandlingen utförs när kvickroten och spillsäden har 3–5 blad eller när vitgröen har bildat ax. Nästa behandling utförs 3 veckor senare. Enkelbehandling används när vitgröe och övriga gräs har 1–3 blad. Ett alternativ är att behandla en gång på hösten och sedan återkomma nästa vår innan jordgubbarna har fått knopp på skaft.

Lök

Löken skall vara på minst ettbladstadium-flerbladstadier innan behandlingen utföres.

Karenstid Ej senare än 40 dagar före skörd.

Kvickrot

Tidpunkt Kvickroten skall ha 3–5 blad.

Ogräs	Dos/ha
Kvickrot	0,3–0,4 l Select + 0,3–0,4 l Renol + 0,3–0,4 l Select + 0,3–0,4 l Renol (3 veckor efter första behandling)

Ettåriga gräsogräs

Vitgröe, kärrgröe, ängsgröe, kärrkavle, renkavle, rödsvingel, timotej, ängsvingel, rajgräs, åkerven, luddlosta, sandlosta, och flyghavre.

Tidpunkt När gräsen normalt har 3–5 blad. Den lägre dosen används när gräsen har 1–3 blad.

OBS ingen effekt på ej uppkommen flyghavre.

Ogräs	Dos/ha
Vitgröe som bildat ax (fröställning)	0,3–0,4 l Select + 0,3–0,4 l Renol + 0,3–0,4 l Select + 0,3–0,4 l Renol (3 veckor efter första behandling)
Vitgröe, övriga gräs	0,3–0,5 l Select + 0,3–0,5 l Renol

Morötter

Morötterna skall ha utvecklat 2 flikiga blad innan behandlingen utföres.

Karenstid Ej senare än 60 dagar före skörd.

Kvickrot

Tidpunkt Kvickroten skall ha 3–5 blad

Ogräs	Dos/ha
Kvickrot	0,5 l Select + 0,5 l Renol

Ettåriga gräsogräs

Vitgröe, kärrgröe, ängsgröe, kärrkavle, renkavle, rödsvingel, timotej, ängsvingel, rajgräs, åkerven, luddlosta, sandlosta, och flyghavre.

OBS ingen effekt på ej uppkommen flyghavre.

Tidpunkt När gräsen normalt har 3–5 blad. Den lägre dosen används när gräsen har 1–3 blad.

Ogräs	Dos/ha
Vitgröe som bildat ax (fröställning)	0,5 l Select + 0,5 l Renol
Övriga gräs	0,3–0,5 l Select + 0,3–0,5 l Renol

Skogsplanteskolor och skogsplanteringar

Gran, tall, bok och ek.

Kvickrot

Tidpunkt När kvickroten har minst 3 blad.

Ogräs	Dos/ha
Kvickrot (engångsbehandling)	0,75–1,0 l Select + 0,75–1,0 l Renol
Kvickrot (delad behandling)	0,5 l Select + 0,5 l Renol + 0,5 l Select + 0,5 l Renol (3 veckor efter första behandling)

Vid kraftig förekomst av kvickrot kan delad dos vara att föredra. Första behandlingen utföres när kvickroten har 3–5 blad. Nästa behandling utföres 3 veckor senare (se ovan).

Ettåriga gräsogräs

Vitgröe, kärrgröe, ängsgröe, kärrkavle, renkavle, rödsvingel, timotej, ängsvingel, rajgräs, åkerven, luddlosta, sandlosta, och flyghavre.

OBS ingen effekt på ej uppkommen flyghavre.

Tidpunkt När gräsen normalt har 3–5 blad. Den lägre dosen används när gräsen har 1–3 blad.

Ogräs	Dos/ha
Vitgröe som har bildat vippa (fröställning)	0,4 l Select + 0,4 l Renol + 0,4 l Select + 0,4 l Renol (3 veckor efter första behandling)
Delad behandling	
Vitgröe, övriga gräs	0,3–0,5 l Select + 0,3–0,5 l Renol

Varningstext

Kan vara farligt vid förtäring. Farligt kan ge lungskador vid förtäring. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

Ät inte, drick inte eller rök inte under hantering. Undvik inandning av rök/dimma.

Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar, (4H, nitril, PVC) samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

Vid kontakt med ögon Spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

Vid förtäring Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Sörj för god ventilation.

Särskilda miljörisker Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Rengör ej sprututrustning i närheten av sjö eller vattendrag. Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening.

Vid misstanke om förgiftning Vila i frisk luft. Kontakta läkare eller Kemiakuten 020-99 60 00.