

Topsin WG

Mot svampsjukdomar i odlingar av höstsäd, prydnadsväxter och i gräsmattor.

Mot markburna svampsjukdomar i samband med sådd och plantering av prydnadsväxter genom jordbehandling.

Behandling av höstsäd får ske senast i 2-nodstadiet.

All annan användning är otillåten.



Bredverkande, systemiskt svampmedel

Både förebyggande och kurativ effekt

Allmän information

Registreringsnr.	4302
Verksam beståndsdel	Tiofanatmetyl 700 g/kg
Behörighetsklass	1 L
Förpackning	1 kg
Lagring	Torrt och svalt
Tillverkare	Nippon Soda Co., Ltd.

Topsin är ett brett verkande systemiskt medel med såväl förebyggande som kurativ effekt mot ett flertal svampsjukdomar. Genom att Topsin har systemisk verkan är alla växtens delar skyddade efterhand som tillväxt sker.

Användning

Fyll halva tanken med vatten. Häll sedan Topsin i tanken under omrörning. Fyll med vatten.

Vattenmängd 100–400 l/ha.

Flertalet bekämpningsmedel kan blandas i den färdiga produkten. Sprutvätskan används omedelbart efter beredning.

Höstbehandling mot utvintringssvampar

Topsin ger ett gott skydd mot de flesta utvintringssvampar (dock ej trädklubba). Bäst resultat mot snömögel uppnås om man sprutar i mitten av oktober till mitten av november. Tillfällig nattfrost kan utnyttjas för bättre bärighet i markerna.

Undvik helst att spruta efter permanent frost. Effekten mot snömögel tycks vara mindre beroende av behandlingstidpunkt. Sprutning kan utföras från början av oktober fram till snöfall.

OBS Bör ej sprutas när växterna är belagda med mycket rimfrost. Kan kombineras med ogräsbekämpningen.

Dos 0,3 kg/ha (0,4 kg vid kraftiga, tidigt sådda bestånd).

Vårbehandling mot stråknäckare

Spruta omedelbart före stråskjutning, när grödan är 25–30 cm hög. Denna behandling ger effekt på stråknäckarsvampen samt en viss nedhållande effekt mot Septoria.

Dos 0,4–0,5 kg/ha.

OBS Medel som innehåller eller bildar bensimidazol (benomyl eller tiofanatmetyl) får användas endast en gång i stråsäd.

Prydnadsväxter

Sprutning mot diverse svampsjukdomar

Dos 0,075% (75 g/100 l vatten).

Sprutvattning mot jordburna svampar

Dos Välrotade äldre plantor, 15 g/10 m² i 20–30 l vatten. Till frösådder och sticklingar, 3 g/10 m² i 20–30 l vatten.

Snömögel i gräsmattor

På gräsmattor och intensiva grönytor som golfgreenar och fotbollsplaner bör ett blandat program användas för att även bekämpa trädklubba och bladfläcksvampar.

Dos 0,3–0,4 kg/ha.

Golfbanor

Kontakta Nordisk Alkali för mer utförliga information på golfbanor.

Varningstext

Farligt vid inandning. Kan ge allergi vid hudkontakt. Möjlig risk för bestående hälsoskador.

Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar av gummi samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

Vid sprutning Använd andningsskydd (helmask med partikelfilter P2).

Vid stänk i ögon Spola genast med mjuk vattenstråle i några minuter.

Vid hudkontakt Tvätta med tvål och vatten.

Särskilda miljörisker Mycket giftigt för fisk och andra vattenlevande organismer. Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Rengör inte sprututrustning i närheten av sjö eller vattendrag. Giftigt för daggmask och andra marklevande organismer.