

UPMA Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde/offlabelprodukter

Produkt	Gröda	Användningsområde	Sökande	Reg.nr.
Diabolo	Gurka i växthus	Preparatet får användas för bekämpning av mjöldagg i yrkesmässig odling av gurka i växthus. Dos: 0,075 % lösning. Högst 2 behandlingar. Karenstid: 3 dagar.	GRO, Gröna näringsriksorganisation	4699
Diflanil 500 SC	Utsädesodlingar av gräsfrö	Mot ogräs i odlingar av gräs för utsäde. 1. Dos: högst 0,15 l/ha Diflanil 500 SC 2. Högst 1 behandling per kalenderår i samma gröda och på samma fält. Behandling på hösten efter skörd av skyddsgröda eller på våren i etablerad gräsfrövall. Härutöver ska de övriga villkor som gäller för produkten följas.	Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare	4989
Epok 600 EC	Penséodling, rosodling på friland	Preparatet får användas mot bladsvamp i penséodling och rosodling. Dos penséodling: 50–100 ml till 100 l vatten. 150–200 ml utspädd lösning per m ² . Dos rosodling: 100 ml till 100 l vatten. Högst tre behandlingar. Skyddshandskar skall användas under och efter behandling vid arbete med plantorna.	GRO, Gröna näringsriksorganisation	4361
Fibro	Bär på friland och i tunnelodling	Mot insekts- och kvalsterangrepp. Användning i BBCH 10–89 (fram till full mognad). Dos: 10 l/ha. Max 2 behandlingar/år. Behandlingsintervall: 7 dagar. Rekommenderad vattenmängd: högst 1 000 l vatten/ha.	Lantbrukarnas Riksförbund	5174
Fibro	Grönsaker på friland	Mot insektsangrepp. Användning i BBCH 10–89. Dos: 10 l/ha. Max 5 behandlingar/år. Behandlingsintervall: 7 dagar. Rekommenderad vattenmängd: högst 600 l vatten/ha.	Lantbrukarnas Riksförbund	5174
Floramite 240 SC	Hallon och björnbär på friland, i växthus och i tunnel	Mot angrepp av kvalster. Får användas <BBCH 85 (före bärens mognad). Dos: 450 ml/ha. Max 2 behandlingar/år. Behandlingsintervall: 7 dagar. Karenstid: 7 dagar.	Lantbrukarnas Riksförbund	4832
Frupica SC	Skogsplantskolor	Preparatet får användas mot svampangrepp i skogsplantskolor. Dos: 0,8 l produkt/ha. Högst två behandlingar. För att skydda akvatiska organismer krävs att anvisningarna i "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd" följs liksom att bestämmelserna i Naturvårdsverkets föreskrift SNFS 1997:2 iakttas.	SCA Skog AB, NorrPlant	4781
Gnatrol SC	Kryddor och sallat i växthus	Mot larver av sorgmyggor. För utvattning eller sprutning. Dos max 10 ml/m ² . Max 3 behandlingar per år med 3–7 dagars intervall. Kortare tid än 22 dygn före skörd får utvattning endast ske genom rännor, på ebb- och flodbord eller via droppbevattning så att inget bevattningsvatten hamnar på ätliga växtdelar.	Lantbrukarnas Riksförbund	5241
Goltix WG	Kepalök på friland	Mot ogräs. Dos: 1,5 kg/ha. Före uppkomst. Max 1 behandling/år	Lantbrukarnas Ekonomi AB	5261
Goltix WG	Utsädesodlingar av spenatfrö på friland	Mot ogräs. Dos: 1,0 kg/ha. Före uppkomst. Max 1 behandling/år. Får inte användas till växter som ska ätas.	Lantbrukarnas Ekonomi AB	5261
Mospilan SG	Blomkål, broccoli, vitkål, rödkål, savojkål, spetskål samt brysselkål	Mot sugande och bitande skadeinsekter i blomkål, broccoli, vitkål, rödkål, savojkål, spetskål samt brysselkål. Maxdos 0,25 kg/ha i 500 l vatten/ha. Högst 2 behandlingar/år. Sprayintervall 7–14 dagar. Behandlingstidpunkt: Tidigast vid BBCH 20. Karenstid för blomkål, broccoli, vit-, röd-, savoj-, och spetskål: 7 dagar. Karenstid för brysselkål: 21 dagar. Härutöver ska de övriga villkor som gäller för produkten följas.	Nisso Chemical Europe GmbH	4739
Mospilan SG	Gurka i växthus	Mot skadeinsekter i odlingar av gurka i växthus. Dos: 0,25–0,5 kg/ha. Högst 3 behandlingar/år. Karenstid: 3 dagar	GRO, Gröna näringsriksorganisation	4739
Mospilan SG	Plantskolor (inklusive skogsplantskolor) och fröplantager	Mot insektsangrepp i plantskolor (inklusive skogsplantskolor) och fröplantager. Max 2 behandlingar från 1 maj–31 augusti. Dos: 350 g/ha.	Föreningen Sveriges Skogsplantproducenter	4739
Quad-Glob 200 SL	Lupin	Nedvissning i yrkesodlingar av lupin. Dos: Högst 3 l Quad-Glob 200 SL/ha. Högst 1 behandling per år. 4 dagars karenstid mellan behandling och skörd. Härutöver ska de övriga villkor som gäller för produkten följas.	Svenska Foder	5022
Ranman Top	Frilandsgurka Plantskolekulturer	Preparatet får användas mot svampsjukdomar i odlingar av frilandsgurka och i plantskolekulturer. Frilandsgurka 1. Maxdos: 80 g a.s Cyazofamid/ha vilket motsvarar 0,5 l Ranman Top/ha 2. Högst 6 behandlingar per år med minst 7–8 dagars intervall 3. Behandlingstidpunkt utvecklingsstadium BBCH 71–89 4. Karenstid 3 dagar Plantskolekulturer 1. Maxdos 80 g a.s Cyazofamid/ha vilket motsvarar 0,5 Ranman Top/ha i 200–400 l vatten 2. Högst 6 behandlingar per år med 7–8 dagars intervall	Lantbrukarnas Riksförbund	4995
Select	Palsternacka	Mot gräsogräs vid odling av palsternacka. BBCH >11. Max 1 behandling. Dos: 0,5 l/ha. Karenstid: 60 dagar.	Lantbrukarnas Ekonomi AB (LRF)	4376

Produkt	Gröda	Användningsområde	Sökande	Reg.nr.
Teppeki	Prydnadsväxter	Preparatet får användas mot bladlöss i prydnadsväxter på friland och i växthus. Friland prydnadsväxter 1. Dos: 140 g/ha (per 200 till 1 000 l vatten). Vattenmängd beroende av kulturens täthet, storlek och utrustning. 2. Bekämpning vid begynnande angrepp. 3. Högst två behandlingar per kultur och säsong och med ca 3 veckors intervall mellan behandlingarna. Växthus prydnadsväxter 4. Dos motsvarande 140 g/ha (per 200 till 100 l vatten). Vattenmängd beroende av kulturens täthet och utrustning. 5. Bekämpning vid begynnande angrepp. 6. Högst tre behandlingar per kultur och säsong och med ca 3 veckors intervall mellan behandlingarna. 7. Vid sprutning ska även andningsskydd bäras. 8. I växthus skall skyddshandskar bäras vid arbete med besprutad kultur.	Lantbrukarnas Riksförbund	4966
Teppeki	Utsädesodlingar av spenat, rättika, gräslök, persilja, timjan, brudslöja, kryssantemum, ringblomma och tvååriga Brassicaväxter (inkl Pak Choy)	Mot insekter i utsädesodlingar av spenat, rättika, gräslök, persilja, timjan, brudslöja, kryssantemum, ringblomma och tvååriga Brassicaväxter (inkl Pak Choy). Vid begynnande angrepp. Max 2 behandlingar/år. Skörden får inte användas till humankonsumtion och/eller foderändamål. Dos 0,14 kg/ha.	Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)	4966
Topsin WG	Äpple och päron	Mot fruktträdsräkta. Får användas i BBCH 93–97 (efter skörd, begynnande bladfall tills alla blad har fallit). Dos: 900 g/ha. Max 1 behandling/år. Användning får endast ske med särskilt avdriftsreducerande utrustning som reducerar avdriften med minst 75 %.	Lantbrukarnas Riksförbund	4888
Turex 50 WP	Blåbär, björnbär, hallon, och krusbär på friland och i tunnel	Mot fjärilslarver. Dos: 1 kg/ha. Max 3 behandlingar/år. Behandlingsintervall: 7 dagar.	Lantbrukarnas Ekonomi AB	4492
Turex 50 WP	Vinbär i tunnel	Mot fjärilslarver. Får användas i BBCH 0–79 (före skörd). Dos: 1 kg/ha. Max 3 behandlingar/år. Behandlingsintervall: 7 dagar.	Lantbrukarnas Ekonomi AB	4492
Turex 50 WP	Jordgubbar i tunnel	Mot fjärilslarver. Får användas i BBCH 13–93 (från att tredje bladet börjat utvecklas till invintringsperioden börjar). Dos: 1 kg/ha. Max 3 behandlingar/år. Behandlingsintervall: 7 dagar.	Lantbrukarnas Ekonomi AB	4492
Turex 50 WP	Köksväxter på friland och i tunnel; t ex kålrot, rova, rättika, rädisa, rödbeta, palsternacka, stjälkselleri, bönor, gröna ärter, rabarber, babyleaf, ruccola, spenat, mangold, mizuna, komatsuma och svartkål	Mot fjärilslarver. Dos: 1 kg/ha. Max 3 behandlingar/år. Behandlingsintervall: 7 dagar.	Lantbrukarnas Ekonomi AB	4492
Turex 50 WP	Köksväxter i tunnel: Salladskål, pakchoi/asiatisk bladkål (choi-kål), blomkål, broccoli, sareptasenap, kålrabbi, röd-, savoj-, vit-, spetskål, brysselkål, grönkål och sallat	Mot fjärilslarver. Dos: 1 kg/ha. Max 3 behandlingar/år. Behandlingsintervall: 7 dagar.	Lantbrukarnas Ekonomi AB	4492
Turex 50 WP	Köksväxter i tunnel: Tomat, paprika, chilipeppar, aubergine, gurka, squash, melon och patisson	Mot fjärilslarver. Dos: 1 kg/ha. Max 6 behandlingar/år. Behandlingsintervall: 7 dagar.	Lantbrukarnas Ekonomi AB	4492
Turex 50 WP	Prydnadsväxter i tunnel; perenner, blommor och plantskoleväxter	Mot fjärilslarver. Dos: 1 kg/ha. Max 6 behandlingar/år. Behandlingsintervall: 7 dagar	Lantbrukarnas Ekonomi AB	4492
Warrant 700 WG	Plantupptragning av sallat och salladskål i växthus	Dos för 1 000 plantor: 3,4 g preparat i 20 l vatten. 1 behandling per kultur. Behandling får inte ske senare än 42 dagar före skörd.	GRO, Gröna näringsriksorganisation	4758