

UPMA Utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområde/offlabelprodukter

Produkt	Gröda	Användningsområde	Sökande	Reg.nr.
Centium 36 SC	Blomkål, broccoli, vitkål, rödkål, savoykål, spetskål, brysselkål och grönkål	Mot ogräs i yrkesmässiga odlingar av blommande kål, huvudkål och bladkål på friland. 7–10 dagar efter plantering. Max 1 behandling. Dos 0,25 l/ha.	Nordisk Alkali AB	4778
Centium 36 SC	Fänkål	Mot ogräs i yrkesmässiga odlingar av fänkål på friland. 7–10 dagar efter plantering. Max 1 behandling. Dos: 0,25 l/ha.	Nordisk Alkali AB	4778
Centium 36 SC	Frilandsgurka	Preparatet får användas mot ogräs i odlingar av frilandsgurka. 1 behandling med 0,25 l/ha.	GRO, Gröna näringens riksorganisation	4778
Centium 36 SC	Gröna bönor och bruna bönor	Mot ogräs i yrkesmässiga odlingar av gröna bönor och bruna bönor på friland. Före uppkomst. Max 1 behandling. Dos: 0,25 l/ha.	Nordisk Alkali AB	4778
Centium 36 SC	Grönkål (sådd) på friland	Ogräsbekämpning vid odling av grönkål. Före uppkomst. Max 1 behandling. Dos: 0,25 l/ha.	Lantbrukarnas Ekonomi AB (LRF)	4778
Centium 36 SC	Krysanterum	Preparatet får användas för bekämpning av ogräs i utsädesodlingar av krysanterum. Dos 0,25 l/ha vid ett tillfälle. Samma fält får inte behandlas oftare än vart tredje år	Skånes Trädgårdsfröodlarför. c/o Hushållningssällskapet Malmöhus	4778
Centium 36 SC	Kålrot (sådd) på friland	Ogräsbekämpning vid odling av kålrot. Före uppkomst. Max 1 behandling. Dos: 0,25 l/ha.	Lantbrukarnas Ekonomi AB (LRF)	4778
Centium 36 SC	Morötter	Bekämpning av örtogräs i morötter efter uppkomst med följande villkor: 1. Maxdos 0,25 l Centium CS 36/ha och år (vilket motsvarar 90 g klomazon/ha och år) 2. Högst 3 behandlingar per år. 3. Behandlingsintervall: 7–14 dagar 4. Behandlingstidpunkt: BBCH 9–14 (efter uppkomst) 5. Denna behandling skall ses som en alternativ strategi för Centium 36 CS. Odlaren får själv välja om behandling skall ske före eller efter uppkomst eller både och men den totala dosen får inte överskrida 0,25 l Centium 36 CS/ha och år. Härutöver ska de övriga villkor som gäller för produkten följas.	Lantbrukarnas Riksförbund	4778
Centium 36 SC	Persilja	Mot ogräs i yrkesmässiga odlingar av persilja på friland. Före uppkomst. Max 1 behandling. Dos: 0,25 l/ha. Karenstid: 28 dagar.	Nordisk Alkali AB	4778
Centium 36 SC	Rabarber	Mot ogräs i yrkesmässiga odlingar av rabarber på friland. Före uppkomst. Planteringsåret får användning ske 7–10 dagar efter plantering. Max 1 behandling. Dos: 0,25 l/ha.	Nordisk Alkali AB	4778
Centium 36 SC	Rotpersilja på friland	Ogräsbekämpning vid odling av rotpersilja. Före uppkomst. Max 1 behandling. Dos: 0,15 l/ha	Lantbrukarnas Ekonomi AB (LRF)	4778
Centium 36 SC	Rot- och stjälselleri	Mot ogräs i yrkesmässiga odlingar av rot- och stjälselleri på friland. 7–10 dagar efter plantering. Max 1 behandling. Dos: 0,25 l/ha.	Nordisk Alkali AB	4778
Centium 36 SC	Sparris	Mot ogräs i yrkesmässiga odlingar av sparris på friland. Efter skörd. Planteringsåret får användning ske före uppkomst. Max 1 behandling. Dos: 0,25 l/ha.	Nordisk Alkali AB	4778
Centium 36 SC	Spenat	Mot ogräs i yrkesmässiga odlingar av spenat på friland. Före uppkomst. Max 1 behandling. Dos: 0,15 l/ha. Karenstid: 35 dagar.	Nordisk Alkali AB	4778
Centium 36 SC	Spenatfrö	Preparatet får användas för bekämpning av ogräs i utsädesodlingar av spenatfrö. Dos: 0,25 l/ha. 1 behandling. Samma fält får inte behandlas oftare än vart tredje år.	Skånes Trädgårdsfröodlarför-ening	4778
Centium 36 SC	Torra kokbönor på friland	Ogräsbekämpning vid odlingar av torra kokbönor. Före uppkomst. Max 1 behandling. Dos: 0,25 l/ha.	Lantbrukarnas Ekonomi AB (LRF)	4778
Diflanil 500 SC	Utsädesodlingar av gräsfrö	Mot ogräs i odlingar av gräs för utsäde. 1. Dos: högst 0,15 l/ha Diflanil 500 SC 2. Högst 1 behandling per kalenderår i samma gröda och på samma fält. Behandling på hösten efter skörd av skyddsgröda eller på våren i etablerad gräsfrövall. Härutöver ska de övriga villkor som gäller för produkten följas.	Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare	4989
Epok 600 EC	Penséodling, rosodling på friland	Preparatet får användas mot bladsvamp i penséodling och rosodling. Dos penséodling: 50–100 ml till 100 l vatten. 150–200 ml utspädd lösning per m ² . Dos rosodling: 100 ml till 100 l vatten. Högst tre behandlingar. Skyddshandskar skall användas under och efter behandling vid arbete med plantorna.	GRO, Gröna näringens riksorganisation	4361
Fenix	Dill, persilja, morötter, rotselleri och gröna ärter	Preparatet får användas mot ogräs i odlingar av dill och persilja samt efter uppkomst i gröna ärter, morötter och rotselleri. Gröna ärter Dos: Högst 0,80 l/ha efter uppkomst; 1 behandling/år. Sista behandlingstidpunkt: när ärterna har 4 internoder (BBCH 34). Morötter Dos: Högst 1,25 l/ha före uppkomst; 1 behandling/år. Högst: 0,75 l/ha efter uppkomst; 3 behandlingar/år. Sista behandlingstidpunkt: när morötterna har 4 örtblad (BBCH 14). Rotselleri Dos: Högst 0,83 l/ha efter uppkomst; 3 behandlingar/år. Karenstid: 70 dagar. Dill Dos: Högst 2 l/ha före uppkomst; 1 behandling/år. Högst: 1 l/ha efter uppkomst; 1 behandling/år. Sista behandlingstidpunkt: När dillen har 2 örtblad (BBCH 12). Persilja Dos: Högst 2 l/ha före uppkomst; 1 behandling/år. Högst: 0,75 l/ha efter uppkomst; 2 behandlingar/år. Sista behandlingstidpunkt: När persiljan har 4 örtblad (BBCH 14).	GRO, Gröna näringens riksorganisation	4123
Fenix	Frösädd lök	Preparatet får användas mot ogräs i odlingar av frösädd lök. Dos: Max 0,7 l Fenix/ha. Högst 2 behandlingar. Behandling får ej ske senare än i 4-bladsstadiet	Kalmar-Ölands Trädgårdsprodukter ek. för.	4123
Fenix	Lupiner	Preparatet får användas mot örtogräs i odling av lupin. Dos: Högst 1,5 l/ha och säsong. Högst: 1 behandling per år före uppkomst.	Svenska Foder	4123
Fenix	Palsternackor	Preparatet får användas mot ogräs efter uppkomst i odlingar av palsternackor. Dos: Högst 1,5 l/ha efter uppkomst; 3 behandlingar om 0,5 l/ha eller 2 behandlingar om 0,75 l/ha.	GRO, Gröna näringens riksorganisation	4123
Fenix	Prydnadsväxter	Preparatet får användas mot ogräs vid drivning av prydnadslökväxter i växthus. Dos: 0,1 l Fenix per 10 l vatten.	GRO, Gröna näringens riksorganisation	4123
Fenix	Åkerbönor	Preparatet får användas för bekämpning av ogräs i odlingar av åkerbönor. Dos: Högst 2,5 l/ha. Behandling ska ske före uppkomst.	Lovang lantbrukskonsult AB	4123

Floramite 240 SC	Hallon, björnbär	Mot angrepp av kvalster i odlingar av hallon och björnbär. Max 2 behandlingar med maxdos 0,45 l/ha med 7 dygns intervall med 7 dygns karens.	Lantbrukarnas Riksförbund	4832
Frupica SC	Skogsplantskolor	Preparatet får användas mot svampangrepp i skogsplantskolor. Dos: 0,8 l produkt/ha. Högst två behandlingar. För att skydda akvatiska organismer krävs att anvisningarna i "Hjälprepa för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd" följs liksom att bestämmelserna i Naturvårdsverkets föreskrift SNFS 1997:2 iakttas.	SCA Skog AB, NorrPlant	4781
Diabolo	Gurka i växthus	Preparatet får användas för bekämpning av mjöldagg i yrkesmässig odling av gurka i växthus. Dos: 0,075 % lösning. Högst 2 behandlingar. Karensid: 3 dagar.	GRO, Gröna näringens riksorganisation	4699
Gnatrol SC	Kryddor och sallat i växthus	Mot larver av sorgmyggor. För utvattning eller sprutning. Dos max 10 ml/m ² . Max 3 behandlingar per år med 3–7 dagars intervall. Kortare tid än 22 dygn före skörd får utvattning endast ske genom rännor, på ebb- och flodbord eller via droppbevattning så att inget bevattningsvatten hamnar på ätliga växtdelar.	Lantbrukarnas Riksförbund	5241
Goltix WG	Spenatfröodling	Preparatet får användas mot ogräs i fröodling av spenat. Dos: Högst 1 kg/ha. Max antal behandlingar: 1.	Skånes Trädgårdsodlarförening	3297
Mospilan SG	Blomkål, broccoli, vitkål, rödkål, savojkål, spetskål samt brysselkål	Mot sugande och bitande skadeinsekter i blomkål, broccoli, vitkål, rödkål, savojkål, spetskål samt brysselkål. Maxdos 0,25 kg/ha i 500 l vatten/ha. Högst 2 behandlingar/år. Sprayintervall 7–14 dagar. Behandlingstidpunkt: Tidigast vid BBCH 20. Karensid för blomkål, broccoli, vit-, röd-, savoj-, och spetskål: 7 dagar. Karensid för brysselkål: 21 dagar. Härutöver ska de övriga villkor som gäller för produkten följas.	Nisso Chemical Europe GmbH	4739
Mospilan SG	Gurka i växthus	Mot skadeinsekter i odlingar av gurka i växthus. Dos: 0,25–0,5 kg/ha. Högst 3 behandlingar/år. Karensid: 3 dagar	GRO, Gröna näringens riksorganisation	4739
Mospilan SG	Plantskolor (inklusive skogsplantskolor) och fröplantager	Mot insektsangrepp i plantskolor (inklusive skogsplantskolor) och fröplantager. Max 2 behandlingar från 1 maj–31 augusti. Dos: 350 g/ha.	Föreningen Sveriges Skogsplantproducenter	4739
Nissorun	Frilandsgurka	Bekämpning av spinnkvalster i odlingar av frilandsgurka. 1. Dos: 0,3 kg Nissorun/ha 2. Högst 2 behandlingar per år 3. Karensid: 3 dagar	GRO, Gröna näringens riksorganisation	3826
Nissorun	Jordgubbar	Bekämpning av spinnkvalster i odlingar av jordgubbar före skörd. 1. Dos: Högst 0,75 kg Nissorun/ha 2. Högst 1 behandling per år 3. Karensid: 7 dagar	GRO, Gröna näringens riksorganisation	3826
Nissorun	Plantskolor, prydnadsväxter	Mot spinnkvalster i plantskolor och odlingar av prydnadsväxter. Dos prydnadsväxter: 0,05 % lösning. Högst 2 behandlingar per säsong. Dos plantskolor: 1 kg/ha. Högst 2 behandlingar per säsong.	GRO, Gröna näringens riksorganisation	3826
Quad-Glob 200 SL	Lupin	Nedvisning i yrkesodlingar av lupin. Dos: Högst 3 liter Quad-Glob 200 SL/ha. Högst 1 behandling per år. 4 dagars karensid mellan behandling och skörd. Härutöver ska de övriga villkor som gäller för produkten följas.	Svenska Foder	5022
Ranman	Frilandsgurka	Preparatet får användas mot svampangrepp i odlingar av frilandsgurka. Dos: 0,2 l Ranman/ha. Högst 6 behandlingar med minst 7 dagars intervall. Karensid: 3 dagar.	GRO, Gröna näringens riksorganisation	4586
Ranman Top	Frilandsgurka Plantskolekulturer	Preparatet får användas mot svampsjukdomar i odlingar av frilandsgurka och i plantskolekulturer. Frilandsgurka 1. Maxdos: 80 g a.s Cyazofamid/ha vilket motsvarar 0,5 l Ranman Top/ha 2. Högst 6 behandlingar per år med minst 7–8 dagars intervall 3. Behandlingstidpunkt utvecklingsstadium BBCH 71–89 4. Karensid 3 dagar Plantskolekulturer 1. Maxdos 80 g a.s Cyazofamid/ha vilket motsvarar 0,5 Ranman Top/ha i 200–400 l vatten 2. Högst 6 behandlingar per år med 7–8 dagars intervall	Lantbrukarnas Riksförbund	4995
Select	Palsternacka	Mot gräsogräs vid odling av palsternacka. BBCH >11. Max 1 behandling. Dos: 0,5 l/ha. Karensid: 60 dagar.	Lantbrukarnas Ekonomi AB (LRF)	4376
Teppeki	Prydnadsväxter	Preparatet får användas mot bladlöss i prydnadsväxter på friland och i växthus. Friland prydnadsväxter 1. Dos: 140 g/ha (per 200 till 1000 l vatten). Vattenmängd beroende av kulturens täthet, storlek och utrustning. 2. Bekämpning vid begynnande angrepp. 3. Högst två behandlingar per kultur och säsong och med ca 3 veckors intervall mellan behandlingarna. Växthus prydnadsväxter 4. Dos motsvarande 140 g/ha (per 200 till 100 l vatten). Vattenmängd beroende av kulturens täthet och utrustning. 5. Bekämpning vid begynnande angrepp. 6. Högst tre behandlingar per kultur och säsong och med ca 3 veckors intervall mellan behandlingarna. 7. Vid sprutning ska även andningskydd bäras. 8. I växthus skall skyddshandskar bäras vid arbete med besprutad kultur.	Lantbrukarnas Riksförbund	4966
Teppeki	Utsädesodlingar av spenat, rättika, gräslök, persilja, timjan, brudslöja, krysantemum, ringblomma och tvååriga Brassicaväxter (inkl Pak Choy)	Mot insekter i utsädesodlingar av spenat, rättika, gräslök, persilja, timjan, brudslöja, krysantemum, ringblomma och tvååriga Brassicaväxter (inkl Pak Choy). Vid begynnande angrepp. Max 2 behandlingar/år. Skörden får inte användas till humankonsumtion och/eller foderändamål. Dos 0,14 kg/ha.	Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)	4966
Topsin WG	Äpple, päron	Mot fruktträdskräfta i äpple- och päronodling. Max 1 behandling med maxdos 900 g/ha efter skörd. Användning får endast ske med särskilt avdriftsreducerande utrustning som reducerar avdriften med minst 75 %.	Lantbrukarnas Riksförbund	4888
Warrant 700 WG	Plantupptragning av sallat och sallatskål i växthus	Dos för 1000 plantor: 3,4 g preparat i 20 l vatten. 1 behandling per kultur. Behandling får inte ske senare än 42 dagar före skörd.	GRO, Gröna näringens riksorganisation	4758