

Villkor för användning av Teppeki

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/situation	Var/område	Syfte	Behandlingsutrustning/metod	Utvecklingsstadium /tidpunkt	Max antal behandlingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Karenstid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Korn och havre		Mot insektsangrepp	Bomspruta	BBCH 21–77	1 per år			140 g/ha	70 g flonikamid/ha	Får ej användas på hösten.	
Råg, rågvete, vete och speltvete		Mot insektsangrepp	Bomspruta	BBCH 21–77	2 per år	21		140 g/ha	70 g flonikamid /ha	Får ej användas på hösten.	
Potatis		Mot insektsangrepp	Bomspruta	BBCH 40–90	2 per år	21	21	160 g/ha	80 g flonikamid /ha		
Sockerbetor och foderbetor		Mot bönbbladlus och persikoblادlus	Bomspruta	BBCH 16–49	1 per år		60	140 g/ha	70 g flonikamid /ha		
Äpple och päron		Mot insektsangrepp	Fläktspruta	BBCH 51–59 BBCH 71–75	3 per år	21	21	140 g/ha	70 g flonikamid /ha		
Ärter, bönor och linser	Fält	Mot bladlöss	Bomspruta	BBCH 11–71	1 per år		14	140 g/ha	70 g flonikamid /ha		X

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Vid spridning	Växtskyddsmedlet får inte spridas på blommande växter där pollinerande insekter aktivt söker efter föda.	Villkoret är till för att skydda bin och andra pollinerande insekter.	
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar och ögonskydd ska användas vid hantering av produkten. Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	