

Produktgodkännande för mindre användningsområde/offlabelprodukter

Produkt	Gröda	Användningsområde	Sökande	Reg.nr.
BotaniGard WP	Jordgubbar på friland och i tunnel	Mot insektsangrepp före och efter blomning. Max 12 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall. Dos: 750 g/ha. Rekommenderad vattenmängd: 600-1 200 l/ha.	Mycotech Europe Ltd	5406
Diabolo	Gurka i växthus	Preparatet får användas för bekämpning av mjöldagg i yrkesmässig odling av gurka i växthus. Dos: Max 0,075 % lösning. Högst 2 behandlingar per år. Karenstid: 3 dagar.	Gröna näringsriksorganisation	4699
Difcor 250 EC	Morötter på friland	Mot svampangrepp. Användning i BBCH 40-49. Dos: 0,5 l/ha. Max 2 behandlingar/år med 14 dagars intervall. Karenstid: 14 dagar. Morotsblasten får inte användas till livsmedel eller foder. Om behandling ska utföras varje år på samma fält får maximalt 0,5 l produkt/ha användas varje enskilt år. Om behandling ska utföras vart tredje år på samma fält får maximalt 1 l produkt/ha användas under behandlingsåret.	Lantbrukarnas Ekonomi Aktieföretag	5601
Diflanil 500 SC	Utsädesodling av gräsför	Mot ogräs i odlingar av gräs för utsäde. 1. Dos: högst 0,15 l/ha Diflanil 500 SC 2. Högst 1 behandling per kalenderår i samma gröda och på samma fält. Behandling på hösten efter skörd av skyddsgröda eller på våren i etablerad gräsförvall. Härutöver ska de övriga ytterligare villkor som gäller för produkten följas.	Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare ek. för.	4989
Fenix	Dill på friland	Mot ogräs, max 1 behandling/år, vid behandling efter uppkomst ska karenstid på 35 dagar beaktas, vattenmängd 200-300 l/ha. Före uppkomst: 0,9 l/ha eller användning i BBCH 00-12: 0,45 l/ha	Lantbrukarnas Riksförbund	5288
Fenix	Bladpersilja på friland	Mot ogräs, vid behandling efter uppkomst ska karenstid på 42 dagar beaktas, vattenmängd 200-300 l/ha. 1 behandling före uppkomst: 0,9 l/ha eller 2 behandlingar i BBCH 00-14 med minst 12 dagars intervall: 0,45 l/ha	Lantbrukarnas Riksförbund	5288
Fenix	Rotpersilja på friland	Mot ogräs, vattenmängd 200-300 l/ha. 1 behandling före uppkomst: 0,9 l/ha eller 2 behandlingar i BBCH 00-14 med minst 12 dagars intervall: 0,45 l/ha eller 3 behandlingar i BBCH 00-14 med minst 7 dagars intervall: 0,3 l/ha	Lantbrukarnas Riksförbund	5288
Fenix	Rotselleri på friland	Mot ogräs, karenstid 70 dagar, vattenmängd 200-300 l/ha. 2 behandlingar i BBCH 14-19 med minst 12 dagars intervall: 0,45 l/ha eller 3 behandlingar i BBCH 14-19 med minst 7 dagars intervall: 0,3 l/ha	Lantbrukarnas Riksförbund	5288
Fenix	Prydnadslökväxter i växthus	Mot ogräs, vattenmängd 1 000 l/ha. 1 behandling/odlingskultur: 0,9 l/ha	Lantbrukarnas Riksförbund	5288
Fenix	Lupin fältodling	Mot ogräs, vattenmängd 200-300 l/ha, behandlad gröda får ej användas till livsmedel. 1 behandling före uppkomst: 0,9 l/ha	Lantbrukarnas Riksförbund	5288
Fenix	Fältodling av purjolök	Mot ogräs. Max 2 behandlingar per år med minst 7 dagars intervall i BBCH 11-16. Dos: 0,25 l/ha. Karenstid: 45 dagar	Lantbrukarnas Ekonomi Aktieföretag	5288
Fenix	Fältodling av salladslök och gräslök	Mot ogräs. Max 2 behandlingar per år med minst 7 dagars intervall i BBCH 00-14. Dos: 0,25 l/ha. Karenstid: 45 dagar	Lantbrukarnas Ekonomi Aktieföretag	5288
Fibro	Bär på friland och i tunnelodling	Mot insekts- och kvalsterangrepp. Användning i BBCH 10-89. Dos: 10 l/ha. Max 2 behandlingar/år. Behandlingsintervall: 7 dagar. Rekommenderad vattenmängd: högst 1 000 l vatten/ha.	Lantbrukarnas Ekonomi Aktieföretag	5817
Fibro	Grönsaker på friland och i tunnel	Mot insekts- och kvalsterangrepp. Användning i BBCH 10-89. Dos: 10 l/ha. Max 5 behandlingar/år. Behandlingsintervall: 7 dagar. Rekommenderad vattenmängd: högst 600 l vatten/ha.	Lantbrukarnas Ekonomi Aktieföretag	5817
Fibro	Gurka och tomat i växthus- och tunnelodling	Mot insekts- och kvalsterangrepp. Användning i BBCH 10-89. Max 2 behandlingar/kultur med minst 7 dagars intervall. Dos: 100 ml/100 m ² . Rekommenderad vattenmängd: 10-15 l vatten/100 m ² .	Lantbrukarnas Ekonomi Aktieföretag	5817
Fibro	Plantskoleväxter på friland och i tunnel	Mot insekts- och kvalsterangrepp. Användning i BBCH 10-89. Max 2 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Dos: 10 l/ha. 300-1 000 l vatten/ha ska användas. Koncentrationen får ej överstiga 2 %.	Lantbrukarnas Ekonomi Aktieföretag	5817
Fibro	Prydnadsväxter i växthus	Mot insekts- och kvalsterangrepp. Användning före BBCH 60 (före blomning). Max 2 behandlingar/kultur med minst 7 dagars intervall. Dos: 100 ml/100 m ² . Rekommenderad vattenmängd: 10-12,5 l vatten/100 m ² .	Lantbrukarnas Ekonomi Aktieföretag	5817
Frupica SC	Skogsplantaskolor	Preparatet får användas mot svampangrepp i skogsplantaskolor. Dos: 0,8 l produkt/ha. Högst två behandlingar per år. För att skydda akvatiska organismer krävs att anvisningarna i "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd" följs liksom att bestämmelserna i Naturvårdsverkets föreskrift SNFS 1997:2 iakttas.	SCA Skog AB, NorrPlant	4781
Gnatrol SC	Kryddor och sallat i växthus	Mot larver av sorgmyggor. För utvattning eller sprutning. Dos max 10 ml/m ² . Max 3 behandlingar per år med 3-7 dagars intervall. Kortare tid än 22 dygn före skörd får utvattning endast ske genom rännor, på ebb- och flodbord eller via droppbevattning så att inget bevattningsvatten hamnar på ätliga växtdelar.	Lantbrukarnas Riksförbund	5241
Lentagran WP	Morötter på friland	Mot örtogräs. Användning i BBCH 12-16. Max 2 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Dos: 0,5 kg/ha	Certis Belchim B.V.	5818
Lentagran WP	Linser och lupiner på friland	Mot örtogräs. Användning i BBCH 13-16. Max 2 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Dos: 1 kg/ha. Totala maximala dosen får inte överskrida 1 kg produkt per hektar och år.	Certis Belchim B.V.	5818
Lentagran WP	Kikärt	Mot örtogräs. Användning i BBCH 11-16. Max 2 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Dos: 1 kg/ha. Totala maximala dosen får inte överskrida 1 kg produkt per hektar och år.	Certis Belchim B.V.	5818
Milbeknock	Jordgubbar på friland	Mot kvalsterangrepp. Användning i BBCH 40-60 och/eller efter BBCH 91. Max 2 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Dos: 1,25 l/ha.	Certis Belchim B.V.	5819
Mospilan SG	Frilandsodling av huvudkål	Mot insektsangrepp. Användning i BBCH 40-85. Dos: 325 g/ha. Max 1 behandling/år. Karenstid: 14 dagar.	Nisso Chemical Europe GmbH	5708
Mospilan SG	Frilandsodling av blomkål och broccoli	Mot bladlöss och mjöllöss/vita flygare. Användning i BBCH 41-46. Dos: 325 g/ha. Max 1 behandling/år. Karenstid: 7 dagar.	Nisso Chemical Europe GmbH	5708
Mospilan SG	Frilandsodling av brysselkål	Mot insektsangrepp. Användning i BBCH 41-47. Dos: 325 g/ha. Max 1 behandling/år. Karenstid: 14 dagar.	Nisso Chemical Europe GmbH	5708
Mospilan SG	Frilandsodling av julgränar och skogsplantaskoleväxter	Mot bladlöss. Användning i plantor mindre än 50 cm höga från maj-augusti. Dos: 250 g/ha. Max 1 behandling/år. Nedåtriktad handhållen spruta ska användas.	Nisso Chemical Europe GmbH	5708
Mospilan SG	Växthusodling av gurka	Mot insektsangrepp. Dos: 0,5 kg/ha. Max 3 behandlingar/år. Karenstid: 3 dagar.	Nisso Chemical Europe GmbH	5708
Mospilan SG	Utsädesproduktion av klöver på friland	Mot insektsangrepp. Användning i BBCH 55-63. Dos: 200 g/ha. Max 1 behandling vartannat år.	Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare ek för	5708
Mospilan SG	Jordgubbar på friland, i tunnel och växthus	Mot insektsangrepp. Användning i BBCH 41-85. Dos: 250 g/ha. Max 1 behandling/år. Karenstid: 3 dagar.	Lantbrukarnas Ekonomi Aktieföretag	5708
Mospilan SG	Hallon i tunnel	Mot insektsangrepp. Användning i BBCH 39-89. Dos: 250 g/ha. Max 1 behandling/år. Karenstid: 3 dagar.	Lantbrukarnas Ekonomi Aktieföretag	5708
NeemAzal-T/S	Frilands-, tunnel- och växthusodling av jordgubbar	Mot insektsangrepp. Användning från BBCH 57. Dos: 3 l/ha. Rekommenderad vattenmängd 300-1 000 l vatten/ha. Max 3 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Karenstid: 3 dagar.	Lantbrukarnas Ekonomi Aktieföretag	5387
NeemAzal-T/S	Frilands-, tunnel- och växthusodling av hallon	Mot insektsangrepp. Användning från BBCH 57. Dos: 3 l/ha. Rekommenderad vattenmängd 300-1 000 l vatten/ha. Max 2 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Karenstid: 3 dagar.	Lantbrukarnas Ekonomi Aktieföretag	5387
NeemAzal-T/S	Frilands- och tunnelodling av björnbär och vinbär	Mot insektsangrepp. Användning från BBCH 57. Dos: 3 l/ha. Rekommenderad vattenmängd 300-1 000 l vatten/ha. Max 2 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Karenstid för björnbär: 3 dagar. Karenstid för vinbär: 7 dagar.	Lantbrukarnas Ekonomi Aktieföretag	5387
NeemAzal-T/S	Plommon och körsbär	Mot insektsangrepp. Användning från BBCH 57. Dos: 3 l/ha. Rekommenderad vattenmängd 300-1 000 l vatten/ha. Max 1 behandling/år. Karenstid: 7 dagar.	Lantbrukarnas Ekonomi Aktieföretag	5387
NeemAzal-T/S	Frilandsodling av vindruvor	Mot insektsangrepp. Användning till BBCH 61. Dos: 3 l/ha. Rekommenderad vattenmängd 400-800 l vatten/ha. Max 2 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall.	Lantbrukarnas Ekonomi Aktieföretag	5387
NeemAzal-T/S	Frilandsodling av purjolök, knippelök, salladslök och gräslök	Mot insektsangrepp. Dos: 3 l/ha. Rekommenderad vattenmängd 300-600 l vatten/ha. Max 3 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Karenstid: 28 dagar.	Lantbrukarnas Ekonomi Aktieföretag	5387
NeemAzal-T/S	Frilandsodling av bladbildande kål	Mot insektsangrepp. Dos: 2,5 l/ha. Rekommenderad vattenmängd 300-600 l vatten/ha. Max 3 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Karenstid: 7 dagar.	Lantbrukarnas Ekonomi Aktieföretag	5387

Produkt	Gröda	Användningsområde	Sökande	Reg.nr.
NeemAzal-T/S	Frilandsodling av sparris	Mot insektsangrepp. Användning efter skörd. Dos: 3 l/ha. Rekommenderad vattenmängd 300-600 l vatten/ha. Max 2 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall.	Lantbrukarnas Ekonomi Aktiebolag	5387
NeemAzal-T/S	Frilands- och tunnelodling av kryddor	Mot insektsangrepp. Dos: 3 l/ha. Rekommenderad vattenmängd 500-800 l vatten/ha. Max 3 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Karenstid: 14 dagar.	Lantbrukarnas Ekonomi Aktiebolag	5387
NeemAzal-T/S	Frilandsodling av spenat och liknande blad	Mot insektsangrepp. Dos: 3 l/ha. Rekommenderad vattenmängd 600-800 l vatten/ha. Max 3 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Karenstid: 7 dagar.	Lantbrukarnas Ekonomi Aktiebolag	5387
Nissorun SC	Prydnadsväxter och plantskoleväxter i växthus	Mot spinnkvalster, vattenmängd 100-150 ml/m ² . Max 2 behandlingar/odlingskultur med minst 7 dagars intervall. Dos: 0,03 ml/m ²	Lantbrukarnas Riksförbund	5334
Nissorun SC	Prydnadsväxter och plantskoleväxter i tunnel och på friland	Mot spinnkvalster, vattenmängd 1 000-1 500 l/ha. Max 2 behandlingar/fält och år i maj-september med minst 30 dagars intervall. Dos: 0,3 l/ha.	Lantbrukarnas Riksförbund	5334
Nissorun SC	Jordgubbar i växthus	Mot spinnkvalster, vattenmängd 40 ml/m ² , karenstid: 3 dagar. Max 1 behandling/år. Dos: 0,024 ml/m ²	Lantbrukarnas Riksförbund	5334
Nissorun SC	Jordgubbar i tunnel	Mot spinnkvalster, vattenmängd minst 400 l/ha, karenstid: 3 dagar. Max 1 behandling/år upp till BBCH 97. Dos: 0,24 l/ha	Lantbrukarnas Riksförbund	5334
Nissorun SC	Tomat och aubergine i växthus	Mot spinnkvalster, vattenmängd 80-160 ml/m ² , karenstid: 3 dagar. Max 1 behandling/odlingskultur Dos: 0,03 ml/m ²	Lantbrukarnas Riksförbund	5334
Proman	Frilandsodling av spenat och arter för utsädesproduktion	Mot ogräs. Före uppkomst (BBCH 00-09). Max 1 behandling/år. Dos: 1 l/ha. Vattenmängd: 200-600 l/ha. Produkten får inte användas mer än vart 3:e år på samma fält.	Lantbrukarnas Ekonomi Aktiebolag	5348 UPMA gäller ej för reg nr 5821
Proman	Frilandsodling av jordgubbar	Mot ogräs. Endast vårbehandling, senast 15 juni och senast 7 dagar efter plantering. Max 1 behandling/år. Dos: 1 l/ha. Vattenmängd: 200-600 l/ha. Produkten får inte användas mer än vart 3:e år på samma fält. Skörd under behandlingsåret får inte gå till konsumtion.	Lantbrukarnas Ekonomi Aktiebolag	5348 UPMA gäller ej för reg nr 5821
Raptol	Blommande kål på friland och i tunnel	Mot insektsangrepp. Användning i BBCH 12-49. Max 2 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Karenstid: 3 dagar. Dos: 6 l/ha. Bladens över- och undersida sprutas till avrinning.	Lantbrukarnas Ekonomi Aktiebolag	5351
Raptol	Havtorn på friland	Mot insektsangrepp. Användning i BBCH 31-87. Max 2 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Karenstid: 3 dagar. Dos: 10 l/ha. Bladens över- och undersida sprutas till avrinning.	Lantbrukarnas Ekonomi Aktiebolag	5351
Raptol	Spåda bladgrönsaker (Baby leaf) på friland, i tunnel och växthus	Mot insektsangrepp. Användning i BBCH 10-18. Max 2 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall. Karenstiden på friland och i tunnel är 3 dagar och i växthus 7 dagar. Dos: 6 l/ha	Lantbrukarnas Ekonomi Aktiebolag	5351
Tepeki	Morötter på friland	Mot insektsangrepp. Användning i BBCH 12-49. Max 2 behandlingar/år med minst 21 dagars intervall. Karenstid: 21 dagar. Dos: 140 g/ha.	Lantbrukarnas Ekonomi Aktiebolag	5847
Tepeki	Frilandsodling av vitkål, rödkål, spetskål och savojkål och brysselkål	Mot insektsangrepp. Användning i BBCH 16-49. Max 2 behandlingar/år med minst 21 dagars intervall. Karenstid för vitkål, rödkål, spetskål och savojkål: 14 dagar. Karenstid för brysselkål: 7 dagar. Dos: 140 g/ha. Rekommenderad vattenmängd är 200-400 l vatten/ha (brysselkål (200 l/ha).	Lantbrukarnas Ekonomi Aktiebolag	5847
Tepeki	Utsädesodling av arter och bönor på friland	Mot insektsangrepp. Användning i BBCH 16-71. Max 2 behandlingar/år med minst 21 dagars intervall. Dos 140 g/ha. Rekommenderad vattenmängd: 200-400 l/ha. Behandlad gröda får inte användas till livsmedel eller foder.	Lantbrukarnas Ekonomi Aktiebolag	5847
Tepeki	Utsädesodling av spenat, rättika, gräslök, persilja, timjan, prydnadsväxter och tvååriga Brassicaväxter (inkl Pak Choy)	Mot insektsangrepp. Användning f o m BBCH 16. Max 2 behandlingar/år med minst 21 dagars intervall. Dos 140 g/ha. Behandlad gröda får inte användas till livsmedel eller foder.	Lantbrukarnas Ekonomi Aktiebolag	5847
Tepeki	Tunnelodling av tomat och aubergine	Mot insektsangrepp. Användning f o m BBCH 16. Max 2 behandlingar/år med minst 21 dagars intervall. Karenstid: 1 dag. Dos: 12 mg/m ² . Rekommenderad vattenmängd: 10-100 ml/m ² .	Lantbrukarnas Ekonomi Aktiebolag	5847
Tepeki	Växthusodling av tomat och aubergine	Mot insektsangrepp. Max 2 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Karenstid: 1 dag. Dos: 12 mg/m ² . Rekommenderad vattenmängd: 40-100 ml/m ²	Lantbrukarnas Ekonomi Aktiebolag	5847
Tepeki	Tunnelodling av gurka	Mot insektsangrepp. Användning f o m BBCH 16. Max 2 behandlingar/år med minst 21 dagars intervall. Karenstid: 1 dag. Dos: 10 mg/m ² . Rekommenderad vattenmängd: 40-100 ml/m ²	Lantbrukarnas Ekonomi Aktiebolag	5847
Tepeki	Växthusodling av gurka	Mot insektsangrepp. Max 2 behandlingar/kultur med minst 7 dagars intervall. Karenstid: 1 dag. Dos: 10 mg/m ² . Rekommenderad vattenmängd: 40-100 ml/m ² .	Lantbrukarnas Ekonomi Aktiebolag	5847
Tepeki	Prydnadsväxter på friland och i tunnel	Mot insektsangrepp. Max 2 behandlingar/år (maj-september) med minst 21 dagars intervall. Dos: 140 g/ha. Rekommenderad vattenmängd: 200-1000 l/ha (40-100 ml/m ² i tunnel).	Lantbrukarnas Ekonomi Aktiebolag	5847
Tepeki	Växthusodling av prydnadsväxter	Mot insektsangrepp. Max 3 behandlingar/kultur med minst 21 dagars intervall. Dos: 14 mg/m ² . Rekommenderad vattenmängd: 20-100 ml/m ²	Lantbrukarnas Ekonomi Aktiebolag	5847
Tepeki	Frilands- och tunnelodling av plantskoleväxter och skogsplantor	Mot insektsangrepp. Max 2 behandlingar/år (maj-september) med minst 21 dagars intervall. Dos: 140 g/ha. Rekommenderad vattenmängd: 200-1 000 l/ha.	Lantbrukarnas Ekonomi Aktiebolag	5847
Tepeki	Växthusodling av plantskoleväxter och skogsplantor	Mot insektsangrepp. Max 3 behandlingar/kultur med minst 21 dagars intervall. Dos: 14 mg/m ² . Rekommenderad vattenmängd: 20-100 ml/m ² .	Lantbrukarnas Ekonomi Aktiebolag	5847
Turex 50 WP	Blåbär, björnbär, hallon, och krusbär på friland och i tunnel	Mot fjärilslarver. Dos: 1 kg/ha. Max 3 behandlingar/år. Behandlingsintervall: 7 dagar.	Lantbrukarnas Ekonomi Aktiebolag	4492
Turex 50 WP	Vinbär i tunnel	Mot fjärilslarver. Får användas i BBCH 0-79 (före skörd). Dos: 1 kg/ha. Max 3 behandlingar/år. Behandlingsintervall: 7 dagar.	Lantbrukarnas Ekonomi Aktiebolag	4492
Turex 50 WP	Jordgubbar i tunnel	Mot fjärilslarver. Får användas i BBCH 13-93 (från att tredje bladet börjat utvecklas till inltringsperioden börjar). Dos: 1 kg/ha. Max 3 behandlingar/år. Behandlingsintervall: 7 dagar.	Lantbrukarnas Ekonomi Aktiebolag	4492
Turex 50 WP	Köksväxter på friland och i tunnel; t ex kålrot, rova, rättika, rädisa, rödbeta, palsternacka, stjälskelleri, bönor, gröna arter, rabarber, babyleaf, ruccola, spenat, mangold, mizuna, komatsuma och svartkål	Mot fjärilslarver. Dos: 1 kg/ha. Max 3 behandlingar/år. Behandlingsintervall: 7 dagar.	Lantbrukarnas Ekonomi Aktiebolag	4492
Turex 50 WP	Köksväxter i tunnel: Salladskål, pakchoi/asiatisk bladkål (choikål), blomkål, broccoli, sareptasenap, kålrabbi, röd-, savoj-, vit-, spetskål, brysselkål, grönkål och sallat	Mot fjärilslarver. Dos: 1 kg/ha. Max 3 behandlingar/år. Behandlingsintervall: 7 dagar.	Lantbrukarnas Ekonomi Aktiebolag	4492
Turex 50 WP	Köksväxter i tunnel: Tomat, paprika, chilipeppar, aubergine, gurka, squash, melon och patisson	Mot fjärilslarver. Dos: 1 kg/ha. Max 6 behandlingar/år. Behandlingsintervall: 7 dagar.	Lantbrukarnas Ekonomi Aktiebolag	4492
Turex 50 WP	Prydnadsväxter i tunnel; perenner, blommor och plantskoleväxter	Mot fjärilslarver. Dos: 1 kg/ha. Max 6 behandlingar/år. Behandlingsintervall: 7 dagar	Lantbrukarnas Ekonomi Aktiebolag	4492

Produkt	Gröda	Användningsområde	Sökande	Reg.nr.
VitiSan	Äpple och päron (friland)	Mot svampangrepp. Max 6 behandlingar/år med minst 3 dagars intervall i BBCH 10-85. Dos: 2,5 kg/m kronhöjd och ha (max 7,5 kg/ha och behandling).	Lantbrukarnas Ekonomi Aktiefbolag	5731
VitiSan	Plommon och körsbär (friland)	Mot svampangrepp. Max 5 behandlingar/år med minst 3 dagars intervall i BBCH 60-85. Dos: 2,5 kg/m kronhöjd och ha (max 7,5 kg/ha och behandling).	Lantbrukarnas Ekonomi Aktiefbolag	5731
VitiSan	Jordgubbar (friland, tunnel, växthus)	Mot svampangrepp. Max 6 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall i BBCH 59-89. Dos: 5 kg/ha (0,5 g/m ²).	Lantbrukarnas Ekonomi Aktiefbolag	5731
VitiSan	Hallon, björnbär, vinbär och krusbär (friland, tunnel)	Mot svampangrepp. Max 6 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall i BBCH 59-89. Dos: 5 kg/ha.	Lantbrukarnas Ekonomi Aktiefbolag	5731
VitiSan	Vinodling (friland)	Mot svampangrepp. Max 6 behandlingar/år med minst 3 dagars intervall från bladutveckling. Dos: 7,5 kg/ha.	Lantbrukarnas Ekonomi Aktiefbolag	5731
VitiSan	Humle (friland)	Mot svampangrepp. Max 6 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall i BBCH lägre eller lika med 31-89. Dos: 7,5 kg/ha.	Lantbrukarnas Ekonomi Aktiefbolag	5731
VitiSan	Tomat och gurka i växthus och tunnel	Mot svampangrepp. Max 6 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall i BBCH 51-89. Dos: 0,5 g/m ² (5 kg/ha).	Lantbrukarnas Ekonomi Aktiefbolag	5731
VitiSan	Sparris (friland, tunnel)	Mot svampangrepp. Max 6 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall. Dos: 5 kg/ha.	Lantbrukarnas Ekonomi Aktiefbolag	5731
VitiSan	Frilandsgurka, pumpa och zucchini (friland, tunnel)	Mot svampangrepp. Max 6 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall i BBCH 51-89. Dos: 5 kg/ha.	Lantbrukarnas Ekonomi Aktiefbolag	5731
VitiSan	Morot (friland)	Mot svampangrepp. Max 6 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall i BBCH 13-79. Dos: 5 kg/ha.	Lantbrukarnas Ekonomi Aktiefbolag	5731
VitiSan	Kålrot (friland)	Mot svampangrepp. Max 6 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall i BBCH 13-49. Dos: 2,5 kg/ha.	Lantbrukarnas Ekonomi Aktiefbolag	5731
VitiSan	Ärter och bönor (friland)	Mot svampangrepp. Max 6 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall i BBCH 51-89. Dos: 5 kg/ha.	Lantbrukarnas Ekonomi Aktiefbolag	5731
VitiSan	Kryddväxter (friland, tunnel, växthus)	Mot svampangrepp. Max 6 behandlingar/år med minst 3 dagars intervall från BBCH 12. Dos: 2,5 kg/ha (0,25 g/m ²).	Lantbrukarnas Ekonomi Aktiefbolag	5731
VitiSan	Plantskoleväxter och prydnadsväxter (friland, tunnel och växthus)	Mot svampangrepp. Max 6 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall. Dos: 5 kg/ha.	Lantbrukarnas Ekonomi Aktiefbolag	5731