

Produkt	Gröda	Användningsområde	Sökande	Reg.nr.
BotaniGard WP	Jordgubbar på friland och i tunnel	Mot insektsangrepp före och efter blomning. Max 12 behandlingar/år med minst 5 dagars intervall. Dos: 750 g/ha. Rekommenderad vattenmängd: 600–1 200 l/ha.	Mycotech Europe Ltd	5406
Diabolo	Gurka i växthus	Preparatet får användas för bekämpning av mjöldagg i yrkesmässig odling av gurka i växthus. Dos: 0,075 % lösning. Högst 2 behandlingar per år. Karenstid: 3 dagar.	GRO, Gröna näringsriksorganisation	4699
Diflanil 500 SC	Utsädesodlingar av gräsfrö	Mot ogräs i odlingar av gräs för utsäde. 1. Dos: högst 0,15 l/ha Diflanil 500 SC 2. Högst 1 behandling per kalenderår i samma gröda och på samma fält. Behandling på hösten efter skörd av skyddsgröda eller på våren i etablerad gräsfrövall. Härutöver ska de övriga villkor som gäller för produkten följas.	Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare	4989
Fenix	Dill på friland	Mot ogräs, max 1 behandling, vid behandling efter uppkomst ska karenstid på 35 dagar beaktas, vattenmängd 200–300 l/ha. Före uppkomst: 0,9 l/ha eller användning i BBCH 00–12: 0,45 l/ha	Lantbrukarnas Riksförbund	5288
Fenix	Bladpersilja på friland	Mot ogräs, vid behandling efter uppkomst ska karenstid på 42 dagar beaktas, vattenmängd 200–300 l/ha. 1 behandling före uppkomst: 0,9 l/ha eller 2 behandlingar i BBCH 00–14 med minst 12 dagars intervall: 0,45 l/ha	Lantbrukarnas Riksförbund	5288
Fenix	Rotpersilja på friland	Mot ogräs, vattenmängd 200–300 l/ha. 1 behandling före uppkomst: 0,9 l/ha eller 2 behandlingar i BBCH 00–14 med minst 12 dagars intervall: 0,45 l/ha eller 3 behandlingar i BBCH 00–14 med minst 7 dagars intervall: 0,3 l/ha	Lantbrukarnas Riksförbund	5288
Fenix	Rotselleri på friland	Mot ogräs, karenstid 70 dagar, vattenmängd 200–300 l/ha. 2 behandlingar i BBCH 14–19 med minst 12 dagars intervall: 0,45 l/ha eller 3 behandlingar i BBCH 14–19 med minst 7 dagars intervall: 0,3 l/ha	Lantbrukarnas Riksförbund	5288
Fenix	Prydnadslökväxter i växthus	Mot ogräs, vattenmängd 1 000 l/ha. 1 behandling/odlingskultur: 0,9 l/ha	Lantbrukarnas Riksförbund	5288
Fenix	Lupin fältodling	Mot ogräs, vattenmängd 200–300 l/ha, behandlad gröda får ej användas till livsmedel. 1 behandling före uppkomst: 0,9 l/ha	Lantbrukarnas Riksförbund	5288
Fibro	Bär på friland och i tunnelodling	Mot insekts- och kvalsterangrepp. Användning i BBCH 10–89 (fram till full mognad). Dos: 10 l/ha. Max 2 behandlingar/år. Behandlingsintervall: 7 dagar. Rekommenderad vattenmängd: högst 1 000 l vatten/ha.	Lantbrukarnas Riksförbund	5174
Fibro	Grönsaker på friland	Mot insektsangrepp. Användning i BBCH 10–89. Dos: 10 l/ha. Max 5 behandlingar/år. Behandlingsintervall: 7 dagar. Rekommenderad vattenmängd: högst 600 l vatten/ha.	Lantbrukarnas Riksförbund	5174
Fibro	Gurka och tomat i växthus- och tunnelodling	Mot insekter och kvalster, vattenmängd 10–15 l/100 m ² . 2 behandlingar/år i BBCH 10–89 med minst 7 dagars intervall. Dos 100 ml/100 m ²	Lantbrukarnas Ekonomi Aktiebolag	5174
Fibro	Plantskoleväxter på friland	Mot insekter och kvalster. Användning i BBCH 10–89. Max 2 behandlingar/år med minst 7 dagars intervall. Dos: 10 l/ha. 300–1 000 l vatten/ha ska användas. Koncentrationen får ej överstiga 2 %.	Lantbrukarnas Riksförbund	5174
Floramite 240 SC	Hallon och björnbär på friland, i växthus och i tunnel	Mot angrepp av kvalster. Får användas <BBCH 85 (före bärens mognad). Dos: 450 ml/ha. Max 2 behandlingar/år. Behandlingsintervall: 7 dagar. Karenstid: 7 dagar.	Lantbrukarnas Riksförbund	4832
Frupica SC	Skogsplantskolor	Preparatet får användas mot svampangrepp i skogsplantskolor. Dos: 0,8 l produkt/ha. Högst två behandlingar per år. För att skydda akvatiska organismer krävs att anvisningarna i "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd" följs liksom att bestämmelserna i Naturvårdsverkets föreskrift SNFS 1997:2 iakttas.	SCA Skog AB, Norr-Plant	4781
Gnatrol SC	Kryddor och sallat i växthus	Mot larver av sorgmyggor. För utvattning eller sprutning. Dos max 10 ml/m ² . Max 3 behandlingar per år med 3–7 dagars intervall. Kortare tid än 22 dygn före skörd får utvattning endast ske genom rännor, på ebb- och flodbord eller via droppbevattning så att inget bevattningsvatten hamnar på ätliga växtdelar.	Lantbrukarnas Riksförbund	5241
Goltix WG	Frilandsodling av morot, palsternacka och rotpersilja	Mot ogräs före uppkomst av grödan. Max 1 behandling per år. Dos: 1,5 kg/ha. 200–300 l vatten/ha ska användas.	Lantbrukarnas Ekonomi AB	5261
Goltix WG	Kepalök på friland	Mot ogräs. Dos: 1,5 kg/ha. Före uppkomst. Max 1 behandling/år	Lantbrukarnas Ekonomi AB	5261
Goltix WG	Utsädesodlingar av spenatfrö på friland	Mot ogräs. Dos: 1,0 kg/ha. Före uppkomst. Max 1 behandling/år. Får inte användas till växter som ska ätas.	Lantbrukarnas Ekonomi AB	5261
Mospilan SG	Blomkål, broccoli, vitkål, rödkål, savojkål, spetskål samt brysselkål	Mot sugande och bitande skadeinsekter i blomkål, broccoli, vitkål, rödkål, savojkål, spetskål samt brysselkål. Maxdos 0,25 kg/ha i 500 l vatten/ha. Högst 2 behandlingar/år. Sprayintervall 7–14 dagar. Behandlingstidpunkt: Tidigast vid BBCH 20. Karenstid för blomkål, broccoli, vit-, röd-, savoj-, och spetskål: 7 dagar. Karenstid för brysselkål: 21 dagar Härutöver ska de övriga villkor som gäller för produkten följas.	Nisso Chemical Europe GmbH	4739
Mospilan SG	Gurka i växthus	Mot skadeinsekter i odlingar av gurka i växthus. Dos: 0,25–0,5 kg/ha. Högst 3 behandlingar/år. Karenstid: 3 dagar	GRO, Gröna näringsriksorganisation	4739
Mospilan SG	Plantskolor (inklusive skogsplantskolor) och fröplantager	Mot insektsangrepp i plantskolor (inklusive skogsplantskolor) och fröplantager. Max 2 behandlingar/år från 1 maj–31 augusti. Dos: 350 g/ha	Föreningen Sveriges Skogsplantproducenter	4739
Nissorun SC	Prydnadsväxter och plantskoleväxter i växthus	Mot spinnkvalster, vattenmängd 100–150 ml/m ² . Max 2 behandlingar/odlingskultur med 7 dagars intervall. Dos: 30 µl/m ²	Lantbrukarnas Riksförbund	5334
Nissorun SC	Prydnadsväxter och plantskoleväxter i tunnel och på friland	Mot spinnkvalster, vattenmängd 1 000–1 500 l/ha. Max 2 behandlingar/fält och år i maj – september med 30 dagars intervall. Dos: 0,3 l/ha	Lantbrukarnas Riksförbund	5334
Nissorun SC	Jordgubbar i växthus	Mot spinnkvalster, vattenmängd 40 ml/m ² , karenstid: 3 dagar. Max 1 behandling/år. Dos: 24 µl/m ²	Lantbrukarnas Riksförbund	5334
Nissorun SC	Jordgubbar i tunnel	Mot spinnkvalster, vattenmängd minst 400 l/ha, karenstid: 3 dagar. Max 1 behandling/år upp till BBCH 97. Dos: 0,24 l/ha	Lantbrukarnas Riksförbund	5334
Nissorun SC	Tomat och aubergine i växthus	Mot spinnkvalster, vattenmängd 80–160 ml/m ² , karenstid: 3 dagar. Max 1 behandling/odlingskultur Dos: 30 µl/m ²	Lantbrukarnas Riksförbund	5334
Proman	Frilandsodling av spenat och arter för utsädesproduktion	Mot ogräs. Före uppkomst (BBCH 00–09). Max 1 behandling/år. Dos: 1 l/ha. Vattenmängd: 200–600 l/ha. Produkten får inte användas mer än vart 3:e på samma fält.	Lantbrukarnas Ekonomi Aktiebolag	5348