

# Växtskydd i kepalök

## Behandlingstidpunkter

### FENIX – mot ogräs

- Före uppkomst till BBCH 14 (4 blad)

### LENTAGRAN WP – mot örtogräs

- Från BBCH 11 till 14 (1–4 blad)
- Karenstid: 56 dagar

### SELECT – mot gräsogräs

- Från BBCH 12 till 45 (2 blad–50 % lökstorlek)
- Karenstid: 40 dagar

### SELECT PLUS – mot gräsogräs


- Från BBCH 12 till 45 (2 blad–50 % lökstorlek)

### SHIRLAN – mot lökbladsmögel

- Från BBCH 40 till 48 (löken har börjar svälla till 50 % av bladen lagt sig)
- Karenstid: 7 dagar

### FAZOR – groningshämmare

- Då ungefär 10% av bladen har lagt sig
- Karenstid: 14 dagar



00	Före uppkomst
05	Rötter växer fram
09	Uppkomst, löken bryter genom markytan
011	Bygelstadiet
012	Vimpelstadiet

11	Första bladet synligt (> 3 cm)
15	Femte bladet synligt (> 3 cm)
41	Bladbasen tjocknar och förlängs
47	70 % av lökstorleken är nådd. 10 % av bladen har böjt sig
49	Bladen är vissna och döda Tillväxten är avslutad och löken är skördeklar

# Ogräsbekämpning i kepalök

## FENIX

- Basprodukt för ogräsbekämpning i kepalök
- Ogräseffekt på flera olika ogräsarter bl a svinmålla, snärjmåra, våtarv och penningört
- Går att blanda med andra herbicider som t ex Lentagran WP

## LENTAGRAN WP

- Kontaktverkan på uppkommet ogräs
- Spetsar till ogrässtrategin mot bl a nattskatta
- Godkänd i flera olika grönsakskulturer som t ex kepalök, purjolök, broccoli, blomkål, vitkål och sockermajs

## SELECT PLUS OCH SELECT

- Mot gräsogräs
- Effekt mot både kvickrot och vitgröe, men även flera andra gräsogräsarter
- Tillåten att använda i flera specialkulturer som t ex kepalök, ärter, rödbetor, potatis och jordgubbar

### Vi rekommenderar

**Alternativ 1:** 1 gång före uppkomst

Dos: 0,9 l/ha

**Alternativ 2:** 2 behandlingar från före uppkomst till BBCH 14 (4 blad). Behandlingsintervall: 12 dagar

Dos: 0,45 l/ha

**Alternativ 3:** 3 behandlingar från före uppkomst till BBCH 14 (4 blad). Behandlingsintervall: 7 dagar

Dos: 0,3 l/ha

I kepalök passar Fenix att användas med låga doser i en strategi med andra herbicider som Lentagran WP och Boxer

**OBS** Ovanstående alternativ får inte kombineras

### Vi rekommenderar

Max 3 behandlingar från att lökens första blad är 3–4 cm

Dos: 0,5 kg/ha

Det är viktigt att löken har ett välutvecklat vaxskikt och är i god tillväxt vid behandling

### Vi rekommenderar

**Select Plus:** Max 1 behandling från BBCH 12–45 (2 blad till 50 % lökstorlek)

Dos: 2 l/ha

**Select:** Max 2 behandlingar från BBCH 12–45 (2 blad till 50 % lökstorlek)

Dos: 0,3–0,5 l/ha. Blanda alltid med lika del Renol