

Cymbal® 45

Cymbal 45 är ett preparat som användes mot bladmögel i potatis

- Har en stoppande effekt mot bladmögel
- Används när behandlingsintervallerna har blivit längre än planerat
- Försäkringsprodukt vid högt bladmögeltryck

Allmän information

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av potatis.

Registreringsnummer 5816

Verksam beståndsdel Cymoxanil 450 g/kg (45 vikt-%)

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/
märkning Varning/ GHS07; H317, H319/ GHS08; H361, H373/
GHS09; H410. Se sida 120

Förpackning 1 kg

Lagring Torrt och svalt

UPMA -

Registreringsinnehavare Certis Belchim B.V.

Verkningsätt

Cymbal 45 verkar lokalsystemiskt men har även en trans-laminär effekt.

Användning

Cymbal 45 är ett svampmedel som användes i potatis mot bladmögel. Produkten skall alltid blandas med andra blad-mögelprodukter eftersom den förebyggande effekten inte varar längre än 3 dagar. Däremot har Cymbal 45 en kurerande effekt upp till 24 timmar efter det att bladmögelsporerna har landat på potatisplantan.

När behandlingsintervallen har blivit längre än planerat så är det fördelaktigt att blanda i Cymbal 45 tillsammans med andra bladmögelpreparat för att uppnå en kurerande och stoppande effekt på bladmögelsporerna. Även när det förväntas högt bladmögeltryck t ex i slutet av juli och under augusti är det fördelaktigt att tillsätta Cymbal 45 i strategin.

Cymbal 45 får användas max 6 gånger per säsong och max 3 gånger i följd.

Dos 0,25 kg/ha.

Vattenmängd 200–400 l/ha.

Cymbal är regnfast så snart sprutvätskan torkat in på bladen. Regn 1–2 timmar efter behandlingen påverkar normalt inte resultatet.

Blandbarhet

Cymbal 45 kan med fördel användas i strategi med t ex Sporax för att uppnå en effektiv tankblandning.

Cymbal 45 kan användas i strategi med alla övriga bladmögelprodukter på den svenska marknaden samt med insektsmedel, ogräsmedel och mikronäringsämnen om det skulle bli aktuellt.

Karenstid 7 dagar.

Användningsvillkor Cymbal 45

Gröda	Syfte	Behandlingsutrustning/ metod	Utvecklingsstadium/säsong (min-max)	Max antal behandlingsår	Behandlings- intervall (dagar)	Karenstid (dagar)	Max dos vid varje behandling
Potatis	Mot svampangrepp	Bomspruta	BBCH 19-91	6	Minst 7	7	0,25 kg/ha



Ytterligare villkor för användning

Använd inte denna produkt eller andra produkter innehållande cymoxanil mer än vart 3:e år på samma fält. Den totala dosen under treårsperioden får högst vara 675 g cymoxanil/ha.

Skyddshandskar och andningsskydd ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska. Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

