

Cymbal® 45

Cymbal är ett preparat som användes mot bladmögel i potatis

- Har en stoppande effekt mot bladmögel
- Används när behandlingsintervallerna har blivit längre än planerat
- Försäkringsprodukt vid högt bladmögelttryck

Allmän information

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av potatis.

Registreringsnummer 5047

Verksam beståndsdel Cymoxanil 45 vikt %

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/
märkning Varning/ GHS07; H317, H319/ GHS08; H361, H373/
GHS09; H410.

Förpackning 1 kg

Lagring Torrt och svalt

UPMA –

Registreringsinnehavare Belchim Crop Protection



Verkningsätt

Cymbal verkar lokalsystemiskt men har även en translo-minär effekt.

Användning

Cymbal är ett svampmedel som användes i potatis mot bladmögel. Produkten skall alltid blandas med andra blad-mögelprodukter eftersom den förebyggande effekten inte varar längre än 3 dagar. Däremot har Cymbal en kurerande effekt upp till 24 timmar efter det att bladmögelsporerna har landat på potatisplantan.

När behandlingsintervallen har blivit längre än planerat så är det fördelaktigt att blanda i Cymbal tillsammans med andra bladmögel preparat för att uppnå en kurerande och stoppande effekt på bladmögelsporerna. Även när det förväntas högt bladmögeltäck t ex. i slutet av juli och under augusti är det fördelaktigt att tillsätta Cymbal.

Cymbal får användas max 6 gånger per säsong och max 3 gånger i följd.

Dos 0,25 kg/ha.

Vattenmängd 200–400 l/ha.

Blandbarhet

Cymbal kan med fördel användas i strategi med Ranman Top pga dess spordödande effekt.

Cymbal kan användas i strategi med alla övriga bladmögel-produkter på den svenska marknaden samt med insekts-medel, ogräsmedel och mikronäringsämnen om detta skulle bli aktuellt.

Karenstid 7 dagar.

Ytterligare villkor för användning

Använd inte denna produkt eller andra produkter inne-hållande cymoxanil mer än vart 3:e år på samma fält. Den totala dosen under treårsperioden får högst vara 675 g cymoxanil/ha.

Skyddshandskar och andningskydd ska användas vid han-tering av produkten samt vid arbetsmoment som inne-bär risk för kontakt med sprutvätska. Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst mot-svarande skydd.



Användningsvillkor Cymbal 45

Gröda	Syfte	Behandlingsutrustning/ metod	Utvecklingsstadium/säsong (min–max)	Max antal behandlingsår	Behandlings- intervall dagar	Karenstid (dygn)	Max dos vid varje behandling
Potatis	Mot svampangrepp	Bomspruta	BBCH 19–91	6	7–10	7	0,25 kg/ha