

# Eradicoat Max

## Kontaktverkande produkt som har effekt på spinnkvalster och vita flygare

- Får användas i alla typer av växthuskulturer
- Ingen karenstid

### Allmän information

#### Användningsområde

Mot spinnkvalster och vita flygare/mjöllöss i växthusodlingar.

Registreringsnummer 5536

Verksam beståndsdel Maltodextrin 433 g/l (40 vikt-%)

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/märkning Fara/GHS05; H318. Se sida 103

Förpackning 5 l

Lagring Förvaras frostfritt

UPMA -

Registreringsinnehavare Certis Belchim B.V.

### Verkningsätt

Eradicoat Max är en kontaktverkande insekticid med effekt på spinnkvalster och vita flygare (mjöllöss). Den aktiva substansen maltodextrin verkar fysikaliskt genom att täppa till insekternas andningsorgan, vilket leder till kvävning.

Vid användning av Eradicoat Max bekämpas de insekter som träffas vid behandlingstillfället och det finns ingen långtidsverkan. Genom att upprepa behandlingen kan effekten under en längre period optimeras.

Effekten kan normalt observeras snabbt, 2–4 timmar efter en behandling.

### Användning

Det är viktigt att tillgodose hög täckningsgrad på den angripna grödan och de skadegörare som ska behandlas eftersom verkningsättet är kontaktverkande. De skadegörare som ska oskadliggöras måste träffas av sprutvätska.

Spinnkvalster sitter ofta på bladens undersida och då är det viktigt att även träffa denna del. Tillväxtpunkten på plantan är en annan del där skadegörare ofta kan hittas som också är viktigt att träffa med sprutvätska.

Bäst effekt av Eradicoat Max uppnås då produkten har möjlighet att torka in snabbt.

Eradicoat Max får användas i alla grödor i växthus. Beroende av hur högt infektionstrycket är av skadegöraren kan upprepade behandlingar behöva göras. Det är tillåtet att utföra max 20 behandlingar med minst 3 dagars intervall mot spinnkvalster och vita flygare/mjöllöss.

Koncentrationen i sprutvätskan får inte överstiga 2 % (t ex 20 ml produkt/l vatten).

Vätskemängden regleras beroende av vilken storlek växten har som ska behandlas (ofta 1 000–3 000 l vatten/ha).

Maxdosering av Eradicoat Max är 6 ml/m<sup>2</sup> (60 l/ha).

Ingen karenstid i någon gröda.

Vissa grödor kan vara känsliga för upprepade behandlingar och därför rekommenderas att alltid testa på några plantor innan en större yta behandlas. Det kan bli en klabbig beläggning kvar på behandlade växter.

Den aktiva substansen maltodextrin i Eradicoat Max är godkänd i ekologisk produktion enligt EU-förordningen 889/2008.



### Nyttoinsekter

Andningsorganen kan täppas till på alla typer av insekter och därför kan nyttoinsekter påverkas negativt vid en behandling. Insättning av nyttoinsekter kan ske så fort produkten har torkat in på växtytan.

### Resistens

Risken för resistens är låg p g a att maltodextrin har ett fysikaliskt verkningsätt. Ingen insektsresistens har heller rapporterats för maltodextrin.



Eradicoat Max passar bra att använda i integrerad produktion genom att alternera med andra produkter med andra verkningsmekanismer.

### Beredning av sprutvätska

Fyll cirka halva tanken på sprutan med vatten, börja omrörningen och tillsätt den beräknade mängden Eradicoat Max. Resterande mängd vatten tillsätts. Se till att produkten är ordentligt blandad före användning.

## Rengöring av sprututrustning

1. Efter avslutad sprutning sköljs sprutan grundligt med rent vatten, sköljvattnet kan eventuellt sprutas över den gröda som just sprutats. Glöm inte att rengöra utrustningen utvändigt.
2. Skölj utrustningen invändigt med rent vatten och medel avsett för rengöring av sprututrustning t ex All Clear Extra.
3. Sköljvatten får under inga omständigheter förorena avlopp, brunnar, åar, dammar etc.

## Personlig skyddsutrustning

Skyddshandskar och ansiktsskydd ska användas vid hantering av produkten eller vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska.

## Att beakta

Bruksanvisning och rekommendationer är baserade på omfattande försök och fleråriga erfarenheter. Nytt sortmaterial, förändrad odlingsteknik, eller uppkommen resistens kan resultera i att preparaten inte ger önskad effekt eller till och med att skador uppstår på grödan. Tillverkaren ansvarar inte för uppkommen skada på grund av sådana förhållanden eller liknande omständigheter, vilka inte kunnat förutses vid preparatets saluförande.

## Ytterligare villkor för användning

Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009. Omfattar inte tunnelodling.

Visir ska användas vid hantering av produkten. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

## Användningsvillkor Eradicoat Max

Gröda	Syfte	Behandlingsutrustning/metod	Utvecklingsstadium/säsong (min-max)	Max antal behandlingar	Behandlingsintervall (dagar)	Karenstid (dagar)	Max dos vid varje behandling
Odlingar i växthus	Mot spinnkvalster och mjöllöss	Sprutning	-	20	Minst 3	-	6 ml/m <sup>2</sup>