

Fazor®

Fazor är ett groningshämmande medel som får användas i kepalök

- Förhindrar eller minskar groningen av lök som ska långtidslagras

Allmän information

Användningsområde

För groningshämmande behandling av kepalök.

Registreringsnummer 4683

Verksam beståndsdel Maleinhydrazid (kaliumsalt) 80,4 vikt-%

Behörighetsklass 2 L

[Klassificering/
märkning](#) GHS09; H411

Förpackning 5 kg

Lagring Torrt och svalt

UPMA –

Registreringsinnehavare Arysta LifeScience



Verkningsätt

Fazor tas upp via lökbladen och transporteras systemiskt ned till löken.

Användning

Det är viktigt att välja rätt spruttidpunkt i förhållande till lökens utveckling för att få optimal effekt.

Behandlingstidpunkt Löken skall behandlas i BBCH stadiet 47–48, när ca 10 % har börjat vika eller lägga sig (ej över 50 %), lämpligen i mitten av augusti månad eller ungefär 14 dagar före lossning.

Bladen skall fortfarande vara gröna. Beakta karenstiden 14 dagar före uppkörning eller lossning.

Dos 3,0–4,0 kg/ha.

Vattenmängd 400–500 l/ha.

Max 1 behandling per år.

Fyll sprutan med 2/3 av vattenbehovet, tillsätt preparatet och resterande vattenmängd under fortsatt omrörning. Låt omrörningen fortsätta hela spruttiden. Blanda inte Fazor med andra preparat.

Spruta med finfördelade munstycke. Undvik dubbel-sprutning. Regn inom 24 timmar kan reducera effekten.



Användningsvillkor Fazor

| Gröda | Syfte | Behandlings- utrustning/ metod | Utvecklings- stadium/säsong (min-max) | Max antal behand- lingar/år | Behandlings- intervall dagar | Karenstid (dygn) | Max dos vid varje behandling | Övrigt |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------|
| Kepalök på friland | För gronings- hämning | Sprutning | BCH 47–48 | 1 | | 14 | 4,0 kg/ha | |