

# Flurostar 200

Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, havre, råg, rågvete, durumvete, fodermajs, gräsfrövall, betesvall och slättervall

- Skonsam
- Inga restriktioner på efterföljande gröda
- Brett behandlingsfönster
- Välprövad blandningspartner

## Allmän information

### Användningsområde

Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, havre, råg, rågvete, durumvete, fodermajs, gräsfrövall, betesvall och slättervall

Registreringsnummer 5019

Verksam beståndsdel Fluroxypyr 200 g/l

Behörighetsklass 2 L

Klassificering/  
märkning Fara/GSH07;H315, H319, H336, GSH08; H304, GHS09; H410.

Förpackning 5 l

Lagring Frostfritt

UPMA -

Registreringsinnehavare Globachem NV



## Verkningsätt

Flurostar 200 är ett systemiskt ogräsmedel med auxinliknande verkan för bekämpning av örtogräs i vår- och höst-säd, majs, gräsfrövall, betesvallar och slättervallar.

Flurostar 200 upptas primärt genom bladen. På känsliga ogräsarter kan man normalt se effekt 1–2 dagar efter behandling. Tillväxten upphör och ogräset vissnar bort under loppet av 2–3 veckor.

## Användning

Flurostar 200 används vid bekämpning av örtogräs på våren och är skonsam mot grödan.

Flurostar 200 kan användas för behandling då ogräset är i aktiv tillväxt och temperaturen 7–8 °C, snabbare effekt erhålles över 12°C. Vid lägre temperaturer kan effekten på ogräset bli svagare.

Behandling med Flurostar 200 avrådes när grödan är under stress på grund av torka, vattensjuk jord, mycket hög dags-temperatur samt om det är risk för låg nattetemperatur eller period med frost kring behandlingstidpunkten.

Växtmaterial från gröda behandlad med Flurostar 200 bör inte användas i växthus eller i kompost.

Flurostar 200 är regnfast 1 timme efter behandling.

## Ogräseffekter

Mycket god effekt mot följande ogräs snärjmåra, förgät-migej, våtarv, dân (för dân max. 4–6 blad vid behandling), åkerbinda och trampört.

Bästa effekt på ogräs med färre än 4 blad och i god tillväxt. Dessutom uppnås i stråsäd mycket god och god till mycket god effekt på följande ogräs då de har 2–4 blad; åkermolke, åkervinda, harkål, nattglim, nattskatta, penningört, plister och nässla, sminkrot, snårvinda, vicker.

## Sprutteknik

Vid behandling rekommenderas användning av spaltspridare som ger medium till fin duschkvalité. Vid grödans 2–6 bladstadium användes normalt 100–200 l vatten och vid senare sprutning 200 l vatten per ha. Flurostar 200 är relativt oberoende av luftfuktigheten, vilket innebär, att man uppnår samma säkra effekt mitt på dagen som vid morgonsprutning.

## Beredning av sprutvätska

Flurostar 200 är blandbart med flertalet herbicider, fungicider och insekticider på marknaden samt de flesta mikronäringsämnen.

Fyll ca halva behållaren med vatten, börja omrörningen och tillsätt den beräknade mängden Flurostar 200. Vid tankblandning med mangansulfat eller magnesiumsulfat skall dessa lösas upp innan Flurostar 200 tillsätts. Resterande mängd vatten tillsätts. Fortsatt omrörningen under transport och behandling.

## Rekommendationer

Gröda	Behandlingstidpunkt	Dosering	Kommentar
Höstsäd - höstvete, höstkorn, råg, rågvete, durumvete	BBCH 20–45	1,0 l/ha	Endast vårbehandling.
Vårsäd - vårkorn, vårvete	BBCH 20–39	0,75 l/ha	
Vårsäd - havre	BBCH 20–31	0,75 l/ha	Obs! behandla inte i havresorten Matilda
Fodermajs	BBCH 13–16	1,0 l/ha	
Nyetableerad gräsfrövall till utsäde, betesvall och slättervall	t o m. juli	0,75 l/ha	Se kommentar nedan*
Etableerad gräsfrövall till utsäde, betesvall och slättervall	t o m. juli	2,0 l/ha	Se kommentar nedan *

\*Använd inte Flurostar 200 vid insädd av klöver, lucern eller andra baljväxter. Släpp inga djur på behandlat område förrän 7 dagar efter behandlingen.

## Ytterligare villkor för användning

Skyddshandskar och ögonskydd ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska.

Betesdjur får inte släppas på bete tidigare än 7 dagar efter behandling.

## Användningsvillkor Flurostar 200

Gröda	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings-stadium/ säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall dagar	Karenstid dygn	Max dos vid varje behandling
Höstvete, höstkorn, råg, rågvete, hösthavre och durumvete	Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 20-45 Endast vårbehandling	1			1 l/ha
Vårvete och vårkorn	Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 20-39	1			0,75 l/ha
Havre	Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 20-31	1			0,75 l/ha
Fodermajs	Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 13-16	1			1 l/ha
Nyetableerad odling av gräsfrö till utsäde, slättervall och betesvall	Mot örtogräs	Bomspruta	t o m. juli	1		7	0,75 l/ha
Etablerad odling av gräsfrö till utsäde, slättervall och betesvall	Mot örtogräs	Bomspruta	t o m. juli	1		7	2 l/ha

