

Topsin® WG

Topsin är ett svampmedel i höstsäd och prydnadsväxter

- Bredverkande, systemiskt svampmedel
- Både förebyggande och kurativ effekt

Allmän information

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av höstvet, råg och höstkorn.
Mot svampangrepp i odlingar av prydnadsväxter.

Registreringsnummer	4888
Verksam beståndsdel	Tiofanatmetyl 700 g/kg
Behörighetsklass	1 L
Klassificering/ märkning	Varning/ GHS07; H302, H332; H317/GHS08; H341/ GHS09; H410.
Förpackning	3 kg
Lagring	Torr och svalt
UPMA	Äpple, päron, skogsplantor i skogsplantaskolor.
Registreringsinnehavare	Nisso Chemical Europe

Verkningsätt

Topsin är ett brett verkande systemiskt medel med såväl förebyggande som kurativ effekt mot ett flertal svampsjukdomar. Genom att Topsin har systemisk verkan är alla växters delar skyddade efterhand som tillväxt sker.

Användning

Höstbehandling mot utvintringssvampar

Topsin ger ett gott skydd mot snömögel och stråknäckare. Bäst effekt uppnås om man behandlar från mitten av oktober fram till permanent snötäcke. Grödan måste ha uppnått BBCH 22 (2 sidoskott). Ju senare desto bättre när det gäller snömögel. Tillfällig nattfrost kan utnyttjas för att uppnå bärighet i fält.

OBS Grödan kan behandlas med rimfrost på bladen om den smälter och torkar in under dagens lopp efter behandlingen. Kan kombineras med behandling mot ogräs.

Dos 0,3–0,4 kg/ha.

BBCH 22–32 (2 sidoskott - 2 nod stadiet).

Vattenmängd 100–400 l/ha.

Vårbehandling mot stråknäckare

Spruta före stråskjutning, senast i stadiet 32. Denna behandling ger effekt på stråknäckarsvampen samt en viss nedhållande effekt mot Septoria.

Dos 0,3–0,4 kg/ha.

BBCH 22–32 (Från 2 sidoskott - 2 nod stadiet).

Vattenmängd 100–400 l/ha.

Blandbarhet

Topsin kan tankblandas med de vanligaste bekämpnings-



medlen för höstbehandling. Sprutvätskan används omedelbart efter beredning.

Beredning av sprutvätska

Fyll halva tanken med vatten. Håll sedan Topsin i tanken under omrörning. Fyll med vatten.

Höstvet och råg mot fusarium

Dos 1,1 kg/ha. BBCH 61–69 (Begynnande blomning - upphörande blomning).

OBS Medel som innehåller tiofanatmetyl får användas endast 1 gång per gröda i stråsäd.

Prydnadsväxter

Sprutning mot diverse svampsjukdomar

Dos 0,075 % (75 g/100 l vatten).

Sprutvattning mot jordburna svampar

Dos Välrotade äldre plantor, 15 g/10 m² i 20–30 l vatten.
Till frösädder och sticklingar, 3 g/10 m² i 20–30 l vatten.

Ytterligare villkor för användning

Återinträde i lokaler där sprutning utförts får inte ske tidigare än 24 timmar efter behandlingen.

Lokalerna ska vädras ordentligt före återinträde.

Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid hantering av produkten eller sprutvätskan.

Skyddshandskar ska användas vid utvattning av spridningsvätska. Skyddshandskar, skyddskläder och andningsskydd ska användas vid arbetsmoment under spridning som innebär risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma. Vid kontakt med behandlade växtdelar ska skyddshandskar och skyddskläder användas.

Omfattar inte tunnelodling.

Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009.

Användningsvillkor Topsin WG

Gröda	Syfte	Behandlingsutrustning/metod	Utvecklingsstadium/säsong (min–max)	Max antal behandlingar/år	Behandlingsintervall dagar	Karenstid (dygn)	Max dos vid varje behandling	Övrigt
Höstkorn, höstvet och råg	Mot svampangrepp	Bomspruta	BBCH 22–32	1	-	-	0,43 kg/ha	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras
Höstkorn, höstvet och råg	Mot svampangrepp	Bomspruta	BBCH 61–69	1	-	-	1,1 kg/ha	Varje rad representerar en behandlingsstrategi. Olika behandlingsstrategier får inte kombineras
Prydnadsväxter för plantuppdragning i växthus	Mot svampangrepp	Utvattning	-	1	-	-	1,5 g/m ²	
Prydnadsväxter	Mot svampangrepp	Sprutning	-	1	-	-	75 mg/m ²	