

CLIOPHAR 600 SL

HERBICID

Faro- och Skyddsangivelser:

EUH401 - För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen
SP1 Förening inte vatten med produkten eller dess behållare.

Första hjälpen

Inandning: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Hudkontakt: Tvätta huden med mycket vatten.
Kontakt med ögonen: Skölj ögonen med vatten i säkerhetssyfte.
Förtäring: Vid obehag, kontakta giftinformationscentral eller läkare.

I nödsituation ring 112 och begär giftinformation.

Reg.nr 5506. Behörighetsklass 2L. Endast för yrkesmässigt bruk.

Mot örtgräs i odlingar av sockerbeter, foderbeter och rödbeter.
Mot örtgräs i odlingar av rödkål, vitkål, spetskål och savojkål på friland.
Mot örtgräs i odlingar av vete, korn, råg, rågvete och havre.
Mot örtgräs i odlingar av lin.
Mot örtgräs i skogsplantkolor och i skogsplanteringar på åkermark.
Mot örtgräs i odlingar av betesvall, slåttervall och gräsfro till utsäde.
Mot örtgräs i odlingar av raps och rybs.
Mot örtgräs i odlingar av majs (gäller ej sockermajs).

All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.

Läs medföljande anvisningar före användningen

Innehåll: Produkten är ett lösligt koncentrat (SL) innehållande 600 g/l klorpyralid.

(Klorpyralid dimetylaminsalt 741g/l)

Förvaras frostfritt!

Ytterligare villkor för användning

Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säker växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".

Registreringsinnehavare:

Arysta LifeScience Benelux SPRL
26/1 rue de Renory
B-4102 Ogrée
Belgien

Marknadsföring och distribution:

Nordisk Alkali AB
Krusvegatan 19
SE-212 25 Malmö, Sverige
Tel: +46 (0) 40 6808530
www.nordiskalkali.se



BRUKSANVISNING

CLIOPHAR 600 SL är ett systemiskt verkannde ogräsmedel mot örtgräs. Full effekt av behandlingen ses först efter 3–4 veckor. Det är viktigt att välja en dos som är lämplig för ogräsets storlek. Bäst resultat fås när ogräsen är aktivt växande vid behandling. Preparatet är ett bladverkannde ogräsmedel som omfördelas till rötter, rotstockar och utlöpare. CLIOPHAR 600 SL är särskilt effektiv mot ogräs som tillhör familjen korgblommiga växter, till exempel ettåriga och fleråriga tistlar och kamomiller.

Användningsvillkor

Gröda eller område	Max enskild dos l/ha	Behandlingstillfälle BBCH	Antal behandlingar per år
Vårraps och vårrybs	0,2	12–55	1
Höstraps och höstrybs	0,2	31 – 55 Endast vårbehandling, Tidigast 1 april.	1
Vete, korn, råg, rågvete och havre	0,2	21–32 Endast vårbehandling, Tidigast 1 april.	1
Sockerbeter, foderbeter och rödbeter	0,2	12–15	1
Rödkål, vitkål, spetskål och savojkål	0,2	12–15	1
Fodermajs	0,2	13–16	1
Lin	0,2	3-5 Turner skalan: första örtbladet utvecklat till stjälken sträckes	1
Skogsplantkolor och skogsplanteringar på åkermark Handhållen spruta.	0,2	Endast vårbehandling, typiskt kring unga träd, 40 – 60 cm höga	1
Slåttervall och betesvall*, gräsfro till utsäde	0,2	Endast vårbehandling	1

*Håll boskap borta från det behandlade området i 7 dagar efter behandling.

Tillsättning av olja rekommenderas i oljevaxter, stråsäd, vall, majs och betor.

Vattenmängd: 100 – 300 L/ha

Optimala förhållanden

För bästa resultat behandla med CLIOPHAR 600 SL när ogräset är i aktiv tillväxt. Effekten på kamomill kan minska om växterna lider av stress från torka vid behandlingstillfället.
Effekten på åkertistel och andra fleråriga ogräs kan bli nedsatt av jordbearbetning inom en period av två veckor före eller efter behandling med CLIOPHAR 600 SL.

CLIOPHAR 600 SL bör inte användas när grödan är fuktig eller när nederbörd förväntas inom sex timmar. Behandla inte om grödan är under stress från kyla, torka, skador från skadegörare, näringsbrist eller dylikt. CLIOPHAR 600 SL bör användas vid dagtemperaturer över 10-12 °C. Behandling skall undvikas vid risk för frostnätter före eller direkt efter behandling.

Restriktioner

Rådfråga växtförädlare innan preparatet används på nya sorter. Uppköpare bör rådfrågas före användning i grödor som ska användas som utsäde.
Behandla inte grödor som är insädda med klöver eller andra baljväxter i blandningar.
Undvik avdrift till känsliga grödor (såsom utsädespotatis).

Beredning av sprutvätska

Fyll tanken till hälften med vatten och tillsätt rätt mängd CLIOPHAR 600 SL, blanda väl, fyll upp med resten av vattnet. Fortsätt omrörningen under transport och besprutning.

Tankblandningar

CLIOPHAR 600SL bör endast tillsättas i tankblandning med andra produkter om krav och restriktioner på andra produktetiketter inte strider mot kraven och restriktionerna på denna etikett. Tankblandningar bör inte tillåtas att stå i tanken och omrörning bör upprätthållas vid alla tidpunkter.
Om produkten används i en tankblandning ska andra produkter blandas med vatten först efter deras krav och CLIOPHAR 600 SL ska tillsättas sist. Tankblandningen måste omröras kontinuerligt tills behandlingen är avslutad.

Spridningsteknik

Applitera Cliophar 600 SL med en medelstor droppstorlek.

Rengöring av sprututrustning

Rengör sprututrustningen noga med vatten och ett flytande rengöringsmedel direkt efter användning. Spruta ut. Fyll med rent vatten och låt stå över natten. Spruta sedan ut vattnet före användning av annan produkt, speciellt vid byte från ogräsmedel till insektsmedel. Spår av CLIOPHAR 600 SL kan skada känsliga grödor (till exempel utsädespotatis) som behandlas senare.

Personlig skyddsutrustning

Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid hantering av produkten eller vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska.

Observera:

Använd inte något växtmaterial behandlat med CLIOPHAR 600 SL för kompostering eller förmultning.
Använd inte gödsel från djur som utfodrats med grödor som är behandlat med CLIOPHAR 600 SL för kompostering.

Efterföljande gröda

Resthalter av CLIOPHAR 600 SL i växtmaterial (inkluderat gödsel) som inte har brutits ned fullständigt kan ha effekt på mottagliga grödor. Följande grödor är känsliga för CLIOPHAR 600 SL: ärtor, bönor och andra baljväxter; morötter och andra flockblommiga växter; potatis; sallad och andra korgblommiga växter; samt växthusväxter. Undvik etablering av känslig gröda året efter behandling med CLIOPHAR 600 SL.

Hacka och införliva alla behandlade växtrester tidig höst (eller så fort som möjligt efter skörd) för att släppa ut eventuella resthalter till jorden, där resthalterna snabbare bryts ner. God lantbrukarsed säkerställer att stubb och halv (inklusive stallgödsel) och andra behandlade växtrester helt bryts ner innan plantering av känsliga grödor.

Resistenshantering:

Den aktiva substansen klorpyralid tillhör HRAC-gruppen O (syntetiska auxiner). Risken för att resistens skall uppstå mot det här preparatet i dessa användningsområden är för tillfället låg. Preparat som hör till samma grupp och har samma verkningsätt bör inte användas på samma skifte flera år efter varandra för att förhindra att resistenta ogrässtammar uppstår.

Avfallshantering

Tom förpackning får inte återanvändas. De tomma förpackningarna ska skojas ordentligt med vatten minst tre gånger och ställas upp och ned minst 30 sekunder för avrinning. Sköjvattnet håller man i sprutan och sprutar ut på fältet. Väl rengjord och torra plastförpackningar med avtagen skruvkork ska lämnas för energitvättning till SvepReturs insamlings- och återvinningssystem för plastförpackningar. Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel lämnas för materialåtervinning vid kommunens återvinningscentral. Företaget är anslutet till SvepRetur (www.svepretur.se).

Att beakta

Bruksanvisning och rekommendationer är baserade på omfattande försök och fleråriga erfarenheter. Nytt sortmaterial, förändrad odlingsteknik eller uppkommen resistens kan resultera i att preparatet inte ger önskad effekt eller till och med att skador uppstår på grödan. Tillverkaren ansvarar inte för uppkommen skada på grund av sådana förhållanden eller liknande omständigheter, vilka inte kunnat förutses vid preparatets saluförande. Följ alltid rutinerna för säkert växtskydd.

SE-CP6-006-03 (0221)

NA0221

1 L