

Läs medföljande anvisningar  
före användningen.

**Riskupplysningar och  
Skyddsanvisningar**

Faroangivelser: Inget

P281: Använd föreskriven  
personlig skyddsutrustning.

EUH401: För att undvika risker  
för människors hälsa och för  
miljön, följ bruksanvisningen

SP1 - : Förorena inte vatten  
med produkten eller dess  
behållare

**Första hjälpen**

Vid förtäring kontakta genast  
läkare och visa denna  
förpackning eller etiketten

**fine**

Fine Agrochemicals Ltd  
Hill End House, Whittington  
Worcester, WR5 2RQ  
Tel: +44 (0)1905 361800  
Fax: +44 (0)1905 361810  
Email: [enquire@fine.eu](mailto:enquire@fine.eu)  
[www.fine.eu](http://www.fine.eu)

**dazide**  
**ENHANCE**<sup>®</sup>

**Tillväxtregulator för växter i växthus**

Reg nr 5033 Behörighetsklass 1L.  
Endast för yrkesmässigt bruk efter  
särskilt tillstånd.

Godkänd för tillväxtreglering av  
prydnadsväxter i växthus.  
All annan användning är otillåten.

Läs medföljande anvisningar  
före användningen.



**Innehåll: 2,5 kg**

® Dazide Enhance är registrerat varumärke  
tillhörande Fine Holdings Limited

Distribueras av:



**Nordisk Alkali AB**  
Hanögatan 8, S-211 24 MALMÖ  
Tel 040-680 85 30  
Fax 040-93 84 00  
E-post [info@nordiskalkali.se](mailto:info@nordiskalkali.se)

DAE/SE/2,5/16



# PRODUKTFAKTA

<b>Medlets verkan:</b>	För tillväxtreglering av prydnadsväxter i växthus. Halten 1,1-dimetyldrazin (UDMH) och N-nitrosodimetylamin (NDMA) får inte överstiga 26 mg/kg respektive 1,7 mg/kg i produkten.
<b>Registreringsnummer:</b>	5033
<b>Behörighetsklass:</b>	1L
<b>Formulering:</b>	Vattenlöslig granulatformulering (SG)
<b>Verksamt ämne:</b>	850 g/kg (85,14 vikt-%) daminozid
<b>Förpackning:</b>	2.5 kg

## ANVÄNDNING SOMRÅDE

Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009.

Vid hantering av produkten eller sprutvätskan samt vid spridning ska skyddshandskar och skyddskläder användas.

Lokalerna ska vädras omsorgsfullt efter behandling.

Återinträde i lokaler där behandling utförts får inte ske inom 24 timmar efter behandlingstidpunkten.

Efter 24 timmar ska skyddsutrustning i form av skyddskläder och skyddshandskar användas vid inträdet. 48 timmar efter behandlingstillfället får återinträde ske utan skyddsutrustning.

## ANVÄNDNINGSVILLKOR

Särskilda villkor ska följas vid användning av växtskyddsmedel. Villkoren framgår av Kemikalieinspektionens godkännande av medlet och är grundade på medlets hälso- och miljörisker samt god jordbrukarsed.

Gröda	Dos max (g/l)	Max vattenvolym (l/ha)	Max antal beh.	Intervall (antal dagar)
Krysantemum, krukväxt	5.0	1000	2	10
Krysantemum för snittblommor, enkla blommor	5.0	1000	3	7
Krysantemum för snittblommor, fyllda blommor	1.25	1000	2	21
Prydnadsväxter och utplanteringsväxter	6.0	1500	3	7
Kalanchoe	3.0	1500	3	7

### Övriga villkor

- Koncentrationen av produkten bör inte överstiga 6 g produkt per liter vatten (0.51% aktiv ingrediens)
- Det maximala antalet behandlingar får inte överskridas.
- Reaktionen på en behandling med DAZIDE ENHANCE kan variera beroende på sort, utvecklingsstadium och plantans fysiska kondition. Under vissa förhållanden kan DAZIDE ENHANCE försena blomningen.
- Vattna inte plantorna under 24 timmer efter behandling med DAZIDE ENHANCE.
- Låt inte överdriven avdrift orsaka överdosering.
- Blanda inte DAZIDE ENHANCE med andra preparat eller kemikalier om det inte speciellt rekommenderas.
- Förvara ej i metallbehållare.
- Gör allttid ett test i mindre skala på nya sorter, innan behandlingen görs i full skala.
- Behandla inte Krysantemum sorten Fandango.

## BRUKSANVISNING

### Verknings sätt

DAZIDE ENHANCE reducerar internodlängden vilket innebär kompaktare och robustare plantor, med kraftiga stjälkar och starkare och mörkare blad.

Sörj för god täckning av plantornas bladverk, spruta till strax innan avrinning.

### Dos, vattenmängd och behandlingstidspunkt

Reaktionen på en behandling med DAZIDE ENHANCE kan variera beroende på sort, utvecklingsstadium och tillväxtfaktorer (temperatur, ljusintensitet etc.). Det rekommenderas att utföra ett test i mindre skala under lokala förhållanden, innan behandlingen görs i full skala.

#### Krysantemum, krukväxt

2.0 till 5.0 g DAZIDE ENHANCE per liter vatten, när nya skott är ca. 2 cm långa. Dosering varierer beroende på kultur. Upprepa behandlingen efter behov efter 7 till 10 dagar. Spruta till strax innan avrinning för att uppnå full effekt.

#### Krysantemum för snittblommor, enkla blommor

2.0 till 4.0 g DAZIDE ENHANCE per liter vatten i de flesta sorter. Applicera produkten i ett program som består av 1-3 behandlingar per gröda i 7-10 dagars intervall, beroende på grödans tillväxt och tillväxtkraft för sorten. För snabbväxande sorter, såsom Euro, en alternativ metod är att utföra en första behandling med 5.0 g Dazide ENHANCE per liter vatten och sedan 7-10 dagar senare en andra behandling med samma dos (5.0 g per liter vatten). För sorterna Shoesmith och Rivalry, 0.6 g Dazide ENHANCE per liter vatten 7 dagar efter blominduktion och 1.0 gram per liter vatten 14 dagar efter det. När blomknoppar är synliga, applicera 2.0 g Dazide ENHANCE per liter vatten.

#### Krysantemum för snittblommor, fyllda blommor

1.0 till 1.25 g DAZIDE ENHANCE per liter vatten, 7 dagar före och 14 dagar efter blominduktion genom kortdagsbehandling.

### Krukväxter, prydnadsväxter och utplanteringsväxter

Krukväxter, prydnadsväxter och utplanteringsväxter, särskilt Aster, Azalea, Brassica, Cosmos, Dicentra, Lobelia, Nemesia, Phlox, Salvia, Tagetes, Viola och Zinnia. 1.0 till 6.0 g DAZIDE ENHANCE per liter vatten, 1 till 3 behandlingar per gröda. Dosering, tidpunkt och antalet av behandlingar som behövs för att styra tillväxten effektivt beror på art och sort som odlas och dess tillväxt och utvecklingsstadium. DAZIDE ENHANCE kan testas på ett brett spektrum av prydnadsväxter, krukväxter och utplanteringsväxter som odlas i växthus. Det rekommenderas att testa DAZIDE ENHANCE på små pilotförsök, att observera effektivitet och selektivitet av produkten i lokala förhållanden och sorter.

### Kalanchoe

1.0 till 3.0 g DAZIDE ENHANCE per liter vatten när plantorna är i aktiv tillväxt. Den första behandlingen sker när nya skott är 2 cm långa, maximala antal behandlingar per gröda är 3. Alla behandlingar måste göras före de första knopparna blir synliga. Behandlingar kan leda till försenad blomning. I svagt ljus och/eller låga temperaturer rekommenderas att behandla med försiktighet på grund av liten risk för fitotoxicitet på blad hos känsliga sorter.

### **Spridningsteknik**

Använd spruta med komprimerad luft eller tryckspruta. Behandla på en sval tidpunkt på dagen på välbevattnade växter men när ytan på bladen är torr.

## **SKYDDSUTRUSTNING**

### Skyddsutrustning

- Använd lämpliga skyddshandskar under blandning/påfyllning och ogenomträngliga skyddskläder lämpliga för appliceringen.
- Maximalt område som behandlas: Mindre än eller lika med 0.1 ha i 1 timme med en spruta med komprimerad luft eller tryckspruta.
- För arbetstagare, använd lämpliga skyddskläder.
- Maximal arbetstid i växthus på behandlade ytor: 3 timmar per dag.
- För att skydda icke-målarter andra än bin, genomför driftsåtgärder lämpliga inom ramen för IPM.

### **Blandningar**

Blanda inte DAZIDE ENHANCE med andra preparat eller kemikalier om det inte speciellt rekommenderas.

### **Beredning av sprutvätska**

Rengör spruttanken noggrant före och efter användning. Tillsätt den mängd DAZIDE ENHANCE som behövs till rent vatten och rör om tills allt har lösts upp fullständigt. Använd omedelbart.

### **Rengöring av sprututrustning**

1. Rengör sprututrustningen ut- och invändigt omedelbart efter användning med rent vatten .
2. Skölj utrustningen invändigt med rent vatten och medel avsett för rengöring av sprututrustning, t ex All Clear™ Extra.

Sköljvatten får under inga omständigheter förorena avlopp, brunnar, åar, dammar etc.

### **Tomemballage**

Förpackningen får inte återanvändas.

Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt.

### **Förvaring**

Förvaras oåtkomligt för barn.

Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

Förvaras i original förpackning, väl tillsluten, på en säker plats.

## **PRODUKTGARANTI, VILLKOR OCH BEGRÄNSNING AV ANSVAR**

Fina Agrochemicals Limited ("FINE") garanterar att denna produkt överensstämmer med specifikationerna som anges på denna etikett. FINE friskriver sig från alla andra garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Det är omöjligt att eliminera alla risker med denna produkt. Plantskador, bristande effekt eller andra oönskade konsekvenser kan uppstå på grund av faktorer såsom närvaro av andra material, appliceringsmetod, användning av produkten annat än i strikt enlighet med denna etiketts instruktioner eller andra faktorer, som alla ligger utanför kontroll av FINE eller säljaren. I den utsträckning det är förenligt med gällande lagstiftning, skall alla sådana risker antas av köparen. FINE's ansvar enligt denna etikett skall begränsas till belopp motsvarande köpeskillingen eller, efter beslut av FINE, ersättningsprodukt utan kostnad. FINE fransäger sig allt ansvar överhuvudtaget för speciella, tillfälliga eller följdskador som resultat av hanteringen eller användningen av denna produkt.