

DIFLANIL^{500 SC}

23_12230901_04 • 00141-SE • NAO123

Användningsområde: Mot örtogräs i odling av vete, korn, höstråg, rågvete och dinkelvete.

All annan användning är otilåten om den inte särskilt tillåts.

Reg.nr. 4989

Behörighetsklass 2L. Endast för yrkesmässig användning.

Läs medföljande anvisningar före användning.

Innehåll: Produkten är ett suspension koncentrat (SC) innehållande 500g/l (42 vikt-%) diflufenikan.

GRUPP

12

HERBICID

HERBICID

Innehåll: **1L e**

Batchnummer och tillverkningsdag:
Se förpackningen.

Förvaras frostfritt

Tom förpackning får inte återanvändas.



5 414572 054388 >

Registreringsinnehavare:


Globachem
Your Crop Counts

Globachem NV
Lichtenberglaan 2019
BE-3800 Sint-Truiden, Belgien.
www.globachem.com

© Diflanil är ett registrerat varumärke tillhörande Globachem NV

Diflanil® 500 SC

UFI: QN10-R0NN-R003-D1W9

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P391 Samla upp spill.

P501 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.

SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. Rengör inte sprututrustningen i närheten av vattendrag. Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.

EUH208 Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.

EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Vid nödsituation, ring 112 och begär giftinformation.

VARNING



Nordisk Alkali
GROWING TOGETHER

Marknadsföring och distribution: Nordisk Alkali AB
Krusegatan 19A, 212 25 Malmö, Sverige • Tel: 040 6808530 • www.nordiskalkali.se

Ytterligare villkor för användning För att begränsa riskerna för växter utanför fältet ska ett vindanpassat skyddsavstånd bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom". Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn" i Hjälpredan.

BRUKSANVISNING

VIKTIGT: Alla anvisningar i detta avsnitt måste läsas noga för att få ett säkert och bra resultat av denna produkt.

Användning DIFLANIL 500 SC kan användas i höstsäd på hösten eller våren och i vårkorn och vårmete på våren. I höstsäd erhålles normalt bäst effekt och resultat om behandlingen sker på hösten. DIFLANIL 500 SC kan användas från strax efter sådd fram till slutet av bestockningen. Bäst effekt får man på ogräs som har mindre än 6 örtblad. DIFLANIL 500 SC passar utmärkt som blandningspartner till ogräsmedel mot gräsogräs vid höstbehandling i höstsäd vilket ger många möjligheter till optimalt utnyttjande och effekt i förhållande till aktuell ogräsförekomst.

Verknings sätt DIFLANIL 500 SC tas upp av ogräsens blad och verkar som kontaktmedel. Vid utsprutning bildas en film på markytan, när sedan ogräsen växer igenom upptas preparatet av ogräsen. Ibland kan det förekomma vita fläckar på grödan vid en sen behandling men dessa är av övergående natur. Synliga effekten på ogräsen syns efter 2–5 dagar som ljusfärgning eller vitfärgning. Nytt ogräs gror normalt och ljusfärgad och dör senare.

DIFLANIL 500 SC bekämpar en rad olika örtogräs och viss effekt mot gräsogräs.

Effekt 0,125–0,25 l/ha. Vid dos 0,25 l/ha Mycket god effekt till god effekt: Plister, åkerviol, veronika, förgätmigej, harkål, lomme, våtarv, åkerrettika, åkersenap. På små ogräs och gynnsamma förhållanden kan den lägre dosen ge en mycket till god effekt.

Markytan innan sprutning Bra ogräsbekämpning beror på väl nedbrukade växtrester eller halmrester före såbäddens beredning. Löst och fluffigt såbädd bör vältas innan sprutningen. Den slutliga såbädden ska vara utan jordkolor. Grödan bör sås till normal djup av 3 cm. Det är viktigt att se till att utsädet är väl täckt. Såbädden skall ha en god markfukt, långvarig torka minskar effekten. Vid mullhalt över 10 % saknas långtidseffekt.

Vattenmängd 200–400 l/ha. Det är viktigt med jämn spruttäckning av marken. Endast en behandling DIFLANIL 500 SC per gröda och år.

Dosering höstmete, höstkorn, råg, rågvete:

Höstbehandling dos: 0,125–0,25 l/ha DIFLANIL 500 SC: Tidpunkt före eller efter grödans

uppkomst till slutet av bestockningen.

Vårbehandling dos: 0,125–0,25 l/ha DIFLANIL 500 SC: Från tillväxtens början till slutet av grödans bestockning. Observera att när ogräsen har mer än 4–6 örtblad ska den högre dosen användas.

Dosering vårkorn och vårmete: 0,125 l/ha DIFLANIL 500 SC. Tidpunkt när kornet/vårmete är i mitten av bestockningen till slutet av bestockningen. Spruta alltid på små ogräs.

Begränsningar Vid eventuell omsådd på våren av en gröda som behandlats på hösten med DIFLANIL 500 SC, kan omsådd ske med vårkorn, vårmete efter en grundlig harvning, potatis kräver en plöjning. Våröljevaxter, ärter, bönor, lökvaxter, klöver och betor skall undvikas för omsådd. Vid sådd av höstraps efter en behandlad gröda med DIFLANIL 500 SC på våren, rekommenderas en plöjning före sådd.

Tillredning Skaka dunken väl före användning. Fyll sprutan med rent vatten till hälften och tillsätt den mängd av DIFLANIL 500 SC som behövs, fyll sedan upp tanken.

Rengöring av sprututrustningen Det är viktigt att sprutan rengörs grundligt med sprutreningsmedel efter behandlingen, eftersom små mängder preparat kan skada känsliga grödor.

Avfallshantering Tom förpackning får inte återanvändas. De tomma förpackningarna ska sköljas ordentligt med vatten minst tre gånger och ställas upp och ned minst 30 sekunder för avrinning. Sköljvattnet häller man i sprutan och sprutar ut på fältet. Väl rengjorda och torra plastförpackningar med avtagen skruvkork ska lämnas för energiutvinning till SvegReturs insamlings- och återvinningsystem för plastförpackningar. Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel lämnas för materialåtervinning vid kommunens återvinningscentral. Företaget är anslutet till SvegRetur (www.svepretur.se). Ej rengjord förpackning och ev. rester av produkten lämnas till godkänd avfallsmottagare.

Lagring Torrt, svalt och frostfritt i väl tillsluten originalförpackning.

Utvidgat produktgodkännande av växtskyddsmedlet Diflanil 500 SC, reg nr 4989, till att omfatta följande mindre användningsområde: Mot ogräs i odlingar av gräs för utsäde.

Medgivandet gäller så länge Diflanil 500 SC är godkänt och under följande villkor:

1. Dos: högst 0,15 l/ha Diflanil 500 SC
2. Högst 1 behandling får göras per kalenderår i samma gröda och på samma fält, genom behandling på hösten efter skörd av skyddsgröda eller på våren i etablerad gräsfrövall.
3. För övrigt gäller samma villkor som i beslut om produktgodkännande för Diflanil 500 SC.

Enligt artikel 51 förordning (EG) nr 1107/2009 om växtskyddsmedel: Den som använder växtskyddsmedel, som är godkänt i form av ett utvidgat användningsområde, gör det på eget ansvar och risk.

Detta medel är prövat i svenska försök. Anvisningarna grundar sig på resultaten från dessa. Då användningen ligger utanför vår kontroll och vi ej kan förutse alla de omständigheter som kan påverka resultatet i det enskilda fallet, kan vi ej påtaga oss något ansvar för eventuella skadeverkningar.

Nytt sortmaterial, förändrad odlingsteknik eller uppkommen resistens kan resultera i att preparatet inte ger önskad effekt eller till och med att skador uppstår på grödan. Tillverkaren ansvarar ej för uppkommen skada på grund av sådana förhållanden eller liknande omständigheter, vilka ej kunnat förutses vid preparatets saluförande. Tillverkaren garanterar för varans kvalitet och jämnhet samt att medlet, under normala förhållanden, är ägnat åt de i bruksanvisningen angivna ändamålen. Tillverkaren fråntar sig däremot allt ansvar för möjliga skador, otillräcklig eller utebliven effekt som har uppstått i förbindelse med köparens inkorrekt lagring, transport, hantering och användning av produkten. Följ alltid anvisningarna för säkert växtskydd.



Jordisk Alkali
GROWING TOGETHER

DIFLANIL 500 SC®

23_12230901_04 • 00141-SE • NAO123

Användningsområde: Mot örtogräs i odling av vete, korn, höstråg, rågvete och dinkelvete.

All annan användning är otilåten om den inte särskilt tillåts.

Reg.nr. 4989

Behörighetsklass 2L. Endast för yrkesmässig användning.

Läs medföljande anvisningar före användning.

Innehåll: Produkten är ett suspension koncentrat (SC) innehållande 500g/l (42 vikt-%) diflufenikan.

GRUPP

12

HERBICID

HERBICID

Innehåll: **1L e**

Batchnummer och tillverkningsdag:
Se förpackningen.

Förvaras frostfritt

Tom förpackning får inte återanvändas.



5 414572 054388 >

Registreringsinnehavare:


Globachem
Your Crop Counts

Globachem NV
Lichtenberglaan 2019
BE-3800 Sint-Truiden, Belgien.
www.globachem.com

© Diflanil är ett registrerat varumärke tillhörande Globachem NV

Diflanil® 500 SC

UFI: QN10-R0NN-R003-D1W9

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P391 Samla upp spill.

P501 Innehållet och behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.

SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. Rengör inte sprututrustningen i närheten av vattendrag. Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.

EUH208 Innehåller 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.

EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Vid nödsituation, ring 112 och begär giftinformation.

VARNING



Nordisk Alkali
GROWING TOGETHER

Marknadsföring och distribution: Nordisk Alkali AB
Krusegatan 19A, 212 25 Malmö, Sverige • Tel: 040 6808530 • www.nordiskalkali.se