



ERADICOAT[®] MAX

**Mot spinnkvalster och vita flygare/mjöllöss i växthusodlingar.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.**

Faro- och Skyddsangivelser:

H318 – Orsakar allvarliga ögonskador

P280 - Använd ansiktsskydd.

EUH401 - För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen

SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.

Första hjälpen

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare. (P305+P351+P338+310)

I nödsituation ring 112 och begär giftinformation.

FARA



BRUKSANVISNING

Verkningsätt

Eradicoat Max är ett kontaktverkande medel med ett fysikaliskt verkningsätt som blockerar skadedjurens andningsorgan vilket leder till kvävning. Vanligtvis ses effekten kort efter applicering. Då produkten enbart är kontaktverkande krävs upprepade behandlingar för att säkerställa effekt under en längre period.

Användning

För god effekt krävs god täckning av sprutvätska på grödan och skadedjuret. Om je

tillräcklig effekt uppnås är detta ofta resultat av dålig täckning. För att minimera effekter på nyttmineraler avdrift sprutteknik användas som minimerar börd till omgivningen. Spruta till avrinning och var uppmärksam på att täcka även bladens undersidor och i tillväxtpunkter beroende av var skadegöraren sitter placerad. Fina droppar ökar möjligheten för en god täckning, men kan också öka risken för avdrift.

Eradicoat Max är mest effektivt vid förhållanden som medför snabb intorkning av preparatet.

424331

Innehåll:

Produkten är ett lösligt koncentrat (SL) innehållande 433 g/l maltodextrin (40 vikt-%).

Reg nr: 5536

Behörighetsklass: 2L

Endast för yrkesmässigt bruk

Läs medföljande anvisningar före användning.

Hållbarhet: 2 år

Förvaras frostfritt

Satsnummer och tillverkningsdatum: Se förpackningen.

Nettoinnehåll:

5 l

Registreringsinnehavare:

Certis Europe BV
Stadsplateau 16,
3521 AZ Utrecht
Nederländerna
Tel: +31 346 552 400

®Eradicoat är ett registrerat varumärke för Certis Europe BV



Nordisk Alkali

member of the Belchim Group



Gröda	Skadedjur	Dosering	Max antal behandlingar	Minsta intervall mellan behandlingar	Karenstid samt tid för återinträde
All typ av odling i växthus	Spinnkvalster: vuxna och nyfmer Vita flygare/Mjöllus: ägg, larver, puppor och vuxna	6 ml/m ²	20	3 dagar	Ej applicerbart

Vätskemängd/koncentration

Koncentrationen i sprutvätskan får inte överstiga 2 % (t ex 20 ml produkt/l vatten). Vätskemängden regleras beroende av vilken storlek växten har som ska behandlas (ofta 1 000–3 000 l vatten/ha). Maxdosering av Eradicoat Max är 6 ml/m² (60 l/ha).

Begränsningar

Behandlingar med Eradicoat Max kan ha negativa effekter på biologisk bekämpning med nyttoinsekter eftersom andningsorganen täpps till på alla typer av insekter. Efter upprepade behandlingar med Eradicoat Max bör det kontrolleras om insättning av nyttoinsekter är nödvändig. Insättning av nyttoinsekter kan ske så snart behandlingen med Eradicoat Max har torkat in.

Skaderisk

Vissa grödor kan vara känsliga för upprepad behandling. Det rekommenderas att alltid testa behandling på några få planter innan större områden behandlas. En klibbig rest av produkten kan bli kvar på behandlade grödor, ex tomat och bladgrönsaker.

Beredning av sprutvätska

Fyll ca halva tanken på sprutan med vatten, börja omrörningen och tillsätt den beräknade mängden Eradicoat Max. Resterande mängd vatten tillsätts. Se till att produkten är ordentligt blandad före användning.

Rengöring av sprututrustning

- Efter avslutad sprutning sköljs sprutan grundligt med rent vatten, sköljvattnet kan ev. sprutas över den gröda som just sprutats. Glöm inte att rengöra utrustningen utvändigt.
- Skölj utrustningen invändigt med rent vatten och medel avsett för rengöring av sprututrustning, t ex All Clear Extra.
- Sköljvatten får under inga omständigheter förorenas avlopp, brunnar, åar, dammar etc.

Personlig skyddsutrustning

Virir ska användas vid hantering av produkten. Skyddshandskar kan användas vid hantering av produkten eller vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska.

Ytterligare villkor

Växthus ska vara täckta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009. Omfattar inte tunnelodling.

Resistenshantering

Ingen insektsresistens har rapporterats för maltodextrin och p g a det fysikaliska verknings sättet är risken för resistens låg. Eradicoat Max lämpar sig bra att använda i integrerad bekämpning genom att alternera med produkter med andra typer av verknings sätt. Detta är speciellt viktigt då samma gröda upprepad odlas i sekvens.

Avfallshantering

Tom förpackning får inte återanvändas. De tomma förpackningarna ska sköljas ordentligt med vatten minst tre gånger och ställas upp och ned minst 30 sekunder för avrinning. Sköljvattnet håller man i sprutan och sprutar ut på fältet. Vål rengjord och torra plastförpackningar med avtagen skruvkork ska lämnas för energitvinnning till SvegReturs insamlings- och återvinningssystem för plastförpackningar. Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel lämnas för materialåtervinning vid kommunens återvinningscentral. Företaget är anslutet till SvegRetur (www.svepretur.se).

Att beakta

Bruksanvisning och rekommendationer är baserade på omfattande försök och fleråriga erfarenheter. Nytt sortmaterial, förändrad odlingsteknik eller uppkommen resistens kan resultera i att preparatet inte ger önskad effekt eller till och med att skador uppstår på grödan. Tillverkaren ansvarar inte för uppkommen skada på grund av sådana förhållanden eller liknande omständigheter, vilka inte kunnet förutses vid preparatets saluförande. Följ alltid rutinerna för säkert växtskydd.