

PRO-opti.



Nettoinnehåll:

10L_e

Användningsområde: Mot ogräs i odlingar av höstvetete, höstkorn, råg och rågvete. Mot ogräs i odling av potatis.

All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.

Parallellhandelstillstånd:
PHT-0068-5566

Behörighetsklass 2L .
Endast för yrkesmässigt bruk

Innehåll

Produkten är ett emulsionskoncentrat (EC) innehållande Prosulfokarb 800 g/l.

Lagring: frostfritt.

Sats nr: Se förpackningen

Faro- och skyddsangivelser

- H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
H410 Mycket giftig för vattenlevande organismer med långtidseffekter
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd
P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp
P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp
P363 Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen
P391 Samla upp spill
P501 Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsmottagare
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen
SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare

VARNING



Första hjälpen

Förtäring: Inducera ej kräkning. Skölj munnen med vatten.

Inandning: Frisk luft och vila.

Hudkontakt: Tvätta med mycket varmt vatten och tvål, alternativt ta en dusch. Tag av förorenade kläder.

Kontakt med ögonen: Tvätta omedelbart ögonen, skölj i 15 min.

Om illamående/irritation kvarstår, sök omedelbart läkarvård (visa upp denna etikett om möjligt).

I nödsituation, ring Giftinformationscentralen 112 (24 h).



DISTRIBUTÖR: **Lantmännen**



Nordisk Alkali

Nordisk Alkali AB

Krusegatan 19, SE-212 25 Malmö, Sverige

Tel: +46 (0) 40 6808530 | www.nordiskalkali.se

member of the Belchim Group

Tillverkare/Registreringsinnehavare: **GLOBALCHEM NV**
Lichtenberglaan 2019 | BE-3800 Sint-Truiden - Belgien.
www.globachem.com

Globachem
Your Crop Counts

VERKNINGSSÄTT

Pro-Opti® är ett preparat med god effekt mot ettåriga gräsogräs och en rad örtogräs. Preparatet tas upp via ogräsens skott och rötter. Såväl groende som nyuppkomna ogräs bekämpas.

Ogräs effekter	Ogräs
Mycket god verkan (91–100 %)	Lomme, penningört, plister, snärjmåra, vitgröe, våtarv, åkerven och veronika
God verkan (71–90 %)	Förgätmigej och svinmålla
Måttlig verkan (41–70 %)	Renkavle, rajgräs, åkerbinda, åkerviol och spillraps
Svag verkan (0–40 %)	Baldersbrå, blåklint, trampört och vallmo

BRUKSANVISNING

Generella rekommendationer:

Max 1 behandling per år. Vattenmängd 150–200 l/ha.

Höstsäd	
Dos:	1,0–4,0 l/ha
Tidpunkt:	Pro-Opti® kan användas från omedelbart efter sädd och fram till att gräsogräs har två blad (BBCH 0-15). Bästa tidpunkt är ofta just när grödan har kommit upp (BBCH 10-11). Använd högre dos under torra förhållanden, om du har kokig såbädd eller vid riklig förekomst av gräsogräs. Vid eventuell förekomst av resistent renkavle skall högsta dos användas. Vid användning av enbart Pro-Opti® på hösten kan en kompletterande behandling på våren behövas.
Potatis	
Dos:	2,0–4,0 l/ha
Tidpunkt:	Behandla på den färdiga kupan med fast kam innan potatisen bryter igenom. Behandling med Pro-Opti® efter potatisens uppkomst kan medföra skada om bladen är fuktiga vid behandling. Eftersträva alltid behandling på torr gröda. Behandling tillåten i mellan BBCH 0-11.

Optimala behandlingsförhållande

- Höstsädesutsådet skall vara väl myllat, sådjup minst tre cm.
- God markfukt är en fördel.
- Eftersträva en jämn och fin såbädd utan kokor.
- Pro-Opti® är skonsamt mot stråsåd och potatis. Hittills har inga sortskillnader observerats.

Begränsningar

- Pro-Opti® bör inte användas i perioder med nattfrost.
- På jordar med hög mullhalt minskar effekten av Pro-Opti®.
- Långvarig torra reducerar effekten.
- Om höstsädesgrödan lider av sylebrist, efter stora regnmängder, kan övergående skador i form av gulnande eller små fläckar på bladen observeras. Detta är i allmänhet utan betydelse för grödan.

OBS! Visa hänsyn till omkringliggande odlingsområden vid användning av prosulfocarb

Att speciellt notera vid ogräsbehandlingen:

- Framför sprutan med låg hastighet och en bomhöjd understigande 50 cm för att undvika avdrift.
- Munstycken som ger grov droppstorlek och minst en 75% avdriftsreducering ska användas.
- Vid torra och varma väderleksförhållanden bör ogräsbehandlingen utföras först när jorden blivit fuktig.

Beredning av sprutvätska

Blanda inte mer sprutvätska än vad som går åt vid behandlingen. Fyll tanken till hälften med vatten. Tillsätt preparat/preparaten var för sig och resten av vattnet under omrörning. Sprutvätskan ska vara under kontinuerlig omrörning under transport och sprutningsarbete.

Använd alltid skyddsutrustning (skyddshandskar och skyddskläder) vid hantering av koncentrat preparat och sprutvätska. Koncentrat preparat eller sprutvätska får

inte komma ut i avlopp, åar eller vattentäcker.

Tankblandning

Olika faktorer såsom vattenkvalitet, temperatur, vattnets hårdhet mm kan inverka på blandningar. Gör därför alltid en provblandning först. Blanda aldrig Pro-Opti® med mer än ett växtskyddsmedel. Läs alltid respektive preparats etikett före blandningen.

Renngöring av sprututrustning

1. Renngör sprututrustningen ut- och invändigt omedelbart efter användning med rent vatten i fält.
2. Skölj tanken invändigt med rent vatten och medel avsett för rengöring av sprututrustning, t ex All Clear™ Extra. Spruta ut sköljvattnet i fält. Läs produktens bruksanvisning före användning.
3. Skölj sprututrustningen med vatten och medel avsett för rengöring av sprututrustning. Slangar, munstycken, ventiler och filter skall genomsköljas och tanken skall stå under omrörning i minst 25 minuter.
4. Filter och munstycken rengörs också separat i vatten tillsatt medel avsett för rengöring av sprututrustning. Denna rengöring bör ske på säker plats, t ex biobädd eller behandlad mark/gröda. Sköljvattnet får inte förorena avlopp, brunnar, åar, dammar etc.

Personlig skyddsutrustning

Skyddshandskar, skyddskläder och ögonskydd ska användas vid hantering av produkten.

Skyddshandskar ska användas vid arbetsmoment med risk för kontakt med sprutvätska eller sprutgärma.

Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Vid spridning på hösten i höstvetete, höstkorn, råg och rågvete

Det fordon som används vid spridning av växtskyddsmedlet ska ha tät förarhytt med ventilation.

Ventilationen ska ha partikelfilter och kolfilter.

Produkten får inte spridas närmare än 500 meter från kommersiella odlingar som ska skördas samma höst och som har åtliga delar ovan jord avsedda för humankonsumtion.

Spridning ska göras mellan klockan 18 och klockan 03.

Lufttemperaturen får vara högst 15 °C vid spridning.

Vindhastigheten får vara högst 3 m/s vid spridning.

Avdriftsreducerande utrustning som reducerar vindavdriften minst 75 % ska användas.

Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbrukspruta med bom". Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn" och "grov duschkvalitet" i Hjälpredan.

Vid spridning på våren i potatis

Det fordon som används vid spridning av växtskyddsmedlet ska ha tät förarhytt med ventilation.

Ventilationen ska ha partikelfilter och kolfilter.

Avdriftsreducerande utrustning som reducerar vindavdriften minst 75 % ska användas.

Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbrukspruta med bom". Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn" och "grov duschkvalitet" i Hjälpredan.

Avfallshantering

Tom förpackning får inte återanvändas. De tomma förpackningarna ska sköljas ordentligt med vatten minst tre gånger och ställas upp och ned minst 30 sekunder för avrinning. Sköljvattnet håller man i sprutan och sprutar ut på fältet. Väl rengjord och torra plastförpackningar med avtagen skruvkork ska lämnas för energiutvinning till SvepReturs insamlings- och återvinningssystem för plastförpackningar. Transportförpackningar som ej varit i direkt kontakt med växtskyddsmedel lämnas för materialåtervinning vid kommunens återvinningscentral. Företaget är anslutet till SvepRetur (www.svepretur.se).

Observera

Observera att användningsvillkor och övriga villkor är lagkrav och måste följas av den som använder medlet. Bruksanvisning och rekommendationer är baserade på omfattande försök och fleråriga erfarenheter.

Nytt sortmaterial, förändrad sprutteknik och odlingsteknik eller uppkomnen resistens kan resultera i att preparatet inte ger önskad effekt eller till och med att skador uppstår på grödan.

Tillverkaren ansvarar ej för uppkommen skada på grund av sådana förhållanden eller liknande omständigheter, vilka ej kunnat förutses vid preparatets saluförande.

Registrerade varumärken: Globachem NV: Pro-Opti® 800 EC

PRO-opti[®]



Användningsområde: Mot ogräs i odlingar av höstvet, höstkorn, råg och rågvete. Mot ogräs i odling av potatis. All annan användning är o tillåten om den inte särskilt tillåtits.

Parallellhandelstillstånd: PHT-0068-5566

Behörighetsklass 2L, endast för yrkesmässigt bruk.

Innehåll

Produkten är ett emulsionskoncentrat (EC) innehållande Prosulfokarb 800 g/l.

Lagring: frostfritt.

Sats nr: Se förpackningen

DISTRIBUTÖR:



Lantmännen



Nordisk Alkali

Nettoinnehåll: **2x10L_e**

Faro- och skyddsangivelser

- H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
- H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
- H410 Mycket giftig för vattenlevande organismer med långtidseffekter
- P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd
- P333 + P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp
- P337 + P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp
- P363 Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen
- P391 Samla upp spill
- P501 Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsmottagare
- EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen
- SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare

VARNING



Första hjälpen

Förtäring: Inducera ej kräkning. Skölj munnen med vatten.

Inandning: Frisk luft och vila.

Hudkontakt: Tvätta med mycket varmt vatten och tvål, alternativt ta en dusch. Tag av förorenade kläder.

Kontakt med ögonen: Tvätta omedelbart ögonen, skölj i 15 min.

Om illamående/irritation kvarstår, sök omedelbart läkarvård (visa upp denna etikett om möjligt).

I nödsituation, ring Giftinformationscentralen 112 (24 h).