

Topsin® WG

Användningsområde: Mot svampangrepp i odlingar av höstvetete, råg och höstkorn. Mot svampangrepp i odlingar av prydnadsväxter. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.

VARNING



Faroangivelser:

- H302 Skadligt vid förtäring.
- H332 Skadligt vid inandning.
- H341 Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H410 Mycket giftig för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser:

- P271 Används endast utomhus eller i välventilerade utrymmen.
- P280 Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd.
- P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
- P308+P313 Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.
- P501 Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.
- EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.
- SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.
(Rengör inte sprututrustningen i närheten av vattendrag/Undvik förorening via avrinning från gårdsplaner och vägar.)

Verksam beståndsdel:
Tiofanatmetyl 70 vikt-%.
Vattendispergerbart granulat.

Beämpningsmedel: Klass 1 L
Registreringsnr.: 4888

Endast för yrkesmässig bruk
efter särskilt tillstånd.

Registreringsinnehavare:
Nisso Chemical Europe GmbH
Berliner Allee 42DE-402 12
Düsseldorf
TYSKLAND

Lagras svalt och frostfritt

Innehåll:

3 kg

© Registrerat varumärke
Nippon Soda Company Ltd., Japan

 **Nordisk Alkali**

member of the Belchim Group 

BRUKSANVISNING

Verkningsätt: Topsin WG är ett brett verkande, systemiskt medel med såväl förebyggande som kurativ effekt mot ett flertal svampsjukdomar. Genom att Topsin WG har systemisk verkan är alla växtens delar skyddade efterhand som tillväxten sker.

Tillredning: Fyll halva tanken med vatten. Håll sedan Topsin WG i tanken under omrörning. Fyll med vatten.

Vattenmängd: 200–400 l/ha i stråsäd. Sprutväska användes omedelbart efter beredningen.

Höstbehandling mot utvintringssvampar i höstsäd (höstvetete, råg och höstkorn)

Topsin WG ger ett gott skydd mot de flesta utvintringssvampar (dock ej trådklubba). Bäst resultat mot stråknäckare uppnås om man sprutar i mitten av oktober till mitten av november. Tillfällig nattfrost kan utnyttjas för bättre bärighet i markerna. Undvik helst att spruta efter permanent frost. Effekten mot snömögel tycks vara mindre beroende av behandlingstidpunkten och sprutningen kan utföras från slutet av oktober fram till snöfall.

OBS bör ej sprutas då växterna är belagda med mycket rimfrost. Kan kombineras med ogräsbekämpningen.

Dos: 0,3–0,4 kg/ha.

Vårbehandling mot stråknäckare i höstsäd (höstvetete och råg)

Spruta omedelbart före stråskjutningen, när grödan är 25–30 cm hög. Denna behandling ger effekt på stråknäckarsvampen samt en viss nedhållande effekt mot Septoria.

Dos: 0,3–0,4 kg/ha.

Mot fusarium i höstvetete och råg

Behandlingen skall ske från begynnande blomning fram till upphörande blomning (BBCH 69). **Dos:** 1,1 kg/ha.

OBS Medel som innehåller tiofanatmetyl får användas endast 1 gång per gröda i stråsäd.

Prydnadsväxter

Sprutning mot diverse svampsjukdomar:

Dos: 0,075 % (75 g/100 l vatten).

Sprutvattning mot jordburna svampar:

Dos: Välotrade äldre plantor, 15 g/10 m² i 20–30 l vatten. Till frösådder och sticklingar, 3 g/10 m² i 20–30 l vatten.

Ytterligare villkor för användningen i prydnadsväxter

Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid hantering av produkten eller sprutväska.

Skyddshandskar ska användas vid utvattning av spridningsvätska.

Skyddshandskar, skyddskläder och andningsskydd ska användas vid arbetsmoment under spridning som innebär risk för kontakt med sprutväska eller sprutdimma.

Vid kontakt med behandlade växtdelar ska skyddshandskar och skyddskläder användas.

Återinträde i utrymmen där sprutning utförts får inte ske tidigare än 24 timmar efter behandlingen. Utrymmet ska vädras ordentligt före återinträde.

Växthus ska vara täkta och permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymmet behöver inte uppfylla definitionen av ett växthus enligt EU-förordning 1107/2009.

Omfattar inte tunnelodling.

Mindre användningsområde (UPMA)

Topsin WG är godkänt att använda i äpple och päron mot frukt-trådkräfta. För vidare information gå in på Kemikalieinspektionens hemsida (www.kemi.se) för att se doseringar, tidpunkter, antal behandlingar och ytterligare villkor.

Avfallshantering

Rester, spill och ej rengjort tomemballage är farligt avfall och ska destrueras i enlighet med gällande lagstiftning. Rengjort tomemballage (efter minst 3 sköljningar med vatten) och ytteremballage som ej har varit i direkt kontakt med medlet kan lämnas på närmaste återvinningscentral för energiåtervinning. Tom förpackning får inte återanvändas. **Rengjord förpackning kan lämnas till SvepRetur (www.svepretur.se)**

Lagring

Lagra torrt och frostfritt i väl tillsluten originalförpackning. Förvara åtskilt från livsmedel och djurfoder. För att undvika risker för människa och miljö följ bruksanvisningen.

OBS Tillverkaren garanterar för varans kvalitet och jämnhet samt att medlet, under normala förhållanden, är ägnat åt de i bruksanvisningen angivna ändamålen. Tillverkaren frångår sig däremot allt ansvar för möjliga skador, otillräcklig eller utebliven effekt som har uppstått i förbindelse med köparens inkorrekt lagring, transport, hantering och användning av produkten.

Tillverkningsnummer: Se separat märke på förpackningen.