

Fenix

– Nytt registreringsnummer från 1a februari 2017 – Reg. nr- 5288

| Gröda | Tidpunkt | Antal behandlingar | Intervall | Dos (l/ha) |
|---|---------------------------------------|-----------------------|-----------|------------|
| Bönor/torkade, kummin, dill (fröproduktion), jordärtskocka | Före uppkomst | 1 | | 0,9 |
| Morot, kepalök, palsternacka | Alternativ 1 Före uppkomst | 1 | | 0,9 |
| Morot, kepalök, palsternacka | Alternativ 2 Före uppkomst-BBCH14 | 2 | 12 | 0,45 |
| Morot, kepalök, palsternacka | Alternativ 3 Före uppkomst-BBCH 14 | 3 | 7 | 0,3 |
| Ärtor (gröna+foder) | Alternativ 1 Före uppkomst | 1 | | 0,9 |
| Ärtor (gröna+foder) | Alternativ 2 BBCH 11-30 | 1 | | 0,35 |
| Potatis | Före uppkomst | 1 | | 1,75 |
| Skogsplantaskola, träd i plantaskola | När plantorna är i vila | 1 | | 0,45 |

Då det finns mer än ett dosalternativ i en gröda får de olika alternativen inte kombineras. Ett alternativ = en behandlingsstrategi!

Ytterligare att tänka på:

- Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom".

- Avdriftsreducerande utrustning som reducerar vindavdrift med minst 50% ska användas

Kontakta gärna din återförsäljare eller oss direkt om du har ytterligare funderingar!

(separat information gällande användning i potatis kommer längre fram)