

SELECT® PLUS

HERBICID

Reg.nr.5293 Behörighetsklass 2L. Endast för yrkesmässigt bruk

Godkänd för användning mot gräsgräs i odlingar av jordgubbar, betor, potatis, morötter, huvudkål, lök, lin, raps, rybs, ärter samt i bönor.

All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.

Läs medföljande anvisningar före användning

Innehåll: Produkten innehåller den aktiva substansen kletodim 120 g/l samt även lacknafta (aromhalt >95%, klotpunktsintervall 165-290°C).

Förvaras torrt och frostfritt.

Select® är ett registrerat varumärke från Arysta Lifescience.

Registreringsinnehavare:

Arysta LifeScience S.A.S.
Route d'Artix, BP 80
64150 Noguères
Frankrike


Marknadsföring och distribution:

Nordisk Alkali AB
Krusegatan 19,
SE-212 52 Malmö, Sverige
Tel: +46 (0) 40 6808530
info@nordiskalkali.se



Nordisk Alkali

member of the Belchim Group



Arysta
LifeScience

5L

7SE1501-0002

1SE0501-0002/A19



Select® PLUS
BRUKSANVISNING

Gröda	Max dos produkt (l/ha)	Max antal behandlingar	Karenstid (dagar)
Jordgubbar	2,0	1	30
Potatis	2,0	1	
Morot	2,0	1	40
Lök	2,0	1	
Huvudkål	2,0	1	28
Bönor (torra och färska)	1,0	1	
Ärter (torra)	1,0	1	
Raps och Rybs	1,0	1	
Socker, foderbetor och rödbetor	2,0	1	
Lin	1,0	1	

Gröda	Dos/ kvickrot	Dos/ettåriga gräsogräs samt spillsäd och flyghavre	Utvecklingsstadium BBCH	Kommentarer
Jordgubbar	1,0–2,0	1,0	12–59 eller 91–97 Från andra bladet – jordgubbarna börjat få knopp på skaft eller efter skörd	Behandling höst, från avslutad skörd fram till mitten av november. Undvik behandling på kvällen vid kraftig daggbildning på hösten. Behandla inte om frostnätter förväntas precis efter behandling.
Morot	1,0–2,0	0,8–1,0	12–45 Från andra bladet – 50 % av förväntad rot diameter uppnåtts	
Potatis	1,5–2,0	0,6–1,0	12–33 Från andra bladet – 30 % av plantorna täcker raderna	
Kepalök	1,0–2,0	0,8–1,0	12–45 Från andra bladet – 50 % av förväntad lökdiameter uppnåtts	
Bönor/torkade och färska med skida	1,0	0,6–1,0	12–19 Från andra bladet utvecklat-9 blad eller fler utvecklade	
Ärter/torkade	1,0	0,6–1,0	12-39 Från 2 blad/klängen-9 eller fler internoder finns	
Höstoljväxter höstbeh.	0,8–1,0	0,6–1,0	12–15 Från 2 örtblad utvecklade-5 örtblad utvecklade	Behandlingstidpunkt fram tom. stadie BBCH 15 dock senast den 1 oktober. Höstbehandling är att föredra. Undvik behandling på kvällen vid kraftig daggbildning på hösten.
Höstoljväxter vårbeh.	0,8–1,0	0,6–1,0	12–50 Från 2 örtblad utvecklade- blomknoppar finns, täckta av blad mitt i bladrossetten	Behandling ska göras före begynnande knoppstadium och så länge knopparna är täckta av blad. När nattfrost har upphört och tillväxten har börjat.
Våroljväxter	0,6–0,7	0,6–0,7	12–50 Från 2 örtblad utvecklade- blomknoppar finns, täckta av blad mitt i bladrossetten	Behandling av vårraps och vårrybs ska ske före begynnande knoppstadium och så länge knopparna är täckta av blad.
Lin	1,0	1,0	≤ 20 cm	
Sockerbetor, foderbetor, rödbetor	1,5–2,0	0,8–1,0	12–33 Från 2 örtblad- Bladtäckning/ Raderna sluter sig	
Huvudkål	1,0–2,0	0,8–1,5	12–41 Från andra bladet – huvudet börjar bildas	

Observera

Mekanisk behandling får ej utföras precis innan en behandling med Select Plus eller förrän ca två veckor efter en Select Plus behandling då kvickroten har börjat vissnat ned.

Optimal behandlingstidpunkt är när ogräsen är i 3-5 bladstadium.

Ingen effekt på ej uppkommen flyghavre.

Select Plus behöver inte användas tillsammans med penetreringsolja då det är en färdigformulerad produkt.

Select Plus är ett systemiskt, selektivt ogräsmedel med effekt på flertalet gräsögräs inklusive vitgröe.

Select Plus tas upp av gräSENS ovanjordiska växtdelar och transporteras systemiskt i växten. Viktiga symptom hos mottagliga gräs är bl.a. att tillväxten upphör inom en vecka efter behandlingen, vävnaden vid tillväxtpunkten övergår sakta i brunt och ruttar, nyare blad blir gulffärgade och avdödas långsamt. Under tiden äldre blad dör övergår deras färg i orange för att därefter bli röda och slutligen purpurffärgade.

God markfukt och gräsögräs i god tillväxt gynnar effekten av Select Plus. Vid stark torka, hög solinstrålning och torkstressade gräs kan en behandling på kvällen vara att föredra.

Regn en timme efter behandlingen påverkar normalt inte resultatet. Vid konstbevattning bör behandlingen med Select Plus utföras efter bevattningen.

Ren gör alltid sprutan med All Clear Extra™ och vatten innan tillredning av sprutvätskan utförs! Eventuella rester av annat ogräsmiddel kan annars lösas upp av Select Plus och ge skador på grödan som skall behandlas.

Resistenshantering

Vissa stammar av gräsögräs har utvecklat resistens mot ogräsmiddel vilket kan leda till dålig effekt. En strategi för att förebygga och motverka resistens bör upprättas. Riktlinjer för strategier har dragits upp av Herbicide Resistance Action Committee (HRAC, www.hracglobal.com).

Select® innehåller kletodim som är en sk ACCase (Acetyl CoA Carboxylase) inhibitor, vilken tillhör "grupp A" enligt HRAC. I denna grupp ingår sk "DIM"-produkter.

Använd endast produkten som en del av en resistensstrategi där det ingår odlingstekniska åtgärder och använd inte enbart kemisk ogräsbekämpning med ACCase inhibitorer. Användning av en annan ACCase inhibitor ökar risken för resistens; använd därför endast en annan ACCase inhibitor för att bekämpa andra ogräs vid en annan tidpunkt.

I en resistensstrategi rekommenderas att integrera både kemiska åtgärder och jordbearbetningsåtgärder. Följande är de viktigaste åtgärderna i en lyckad resistensstrategi:

- Följ de riktlinjer som ställts upp av HRAC för att förhindra uppkomst av resistent ogräs.
- Använd odlingstekniska åtgärder i så stor utsträckning som möjligt (tex varierad växtföljd, plöjning, senarelagd sådd etc.).
- Använd ogräsmiddel med olika verkningssätt i tankblandning eller i sekvens, antingen i samma gröda eller i efterföljande grödor.
- Använd Select Plus vid den optimala behandlingstidpunkten (enligt bruksanvisning) på ogräs i aktiv tillväxt utan att reducera dosen, speciellt när resistens misstänks.

- Identifiera så vitt det är möjligt vilka dina resistent ogräs är. Detta kan hjälpa dig att bestämma vilket ogräspreparat som är lämpligast att använda.
- Bevaka fälten regelbundet för att upptäcka och undersöka ev dåliga effekter.

ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

Använd alltid en väl rengjord spruta innan tillredning av sprutvätskan utförs!

Vattnemängd: 200-400 l/ha

Tillredning: Fyll sprutan till ½ med vatten. Tillsätt därefter Select Plus under omrörning. Skölj preparatbehållaren noga och håll sköljvattnet i tanken och fyll på resten av vattnet. Ha på tankens omrörning till all vätska är sprutad. Tillredd sprutvätska skall sprutas ut omedelbart.

Ren göring: Börja alltid sprutningen med en väl ren- gjord spruta. Omedelbart efter en behandling med Select Plus rengörs hela sprutan, inklusive tank, ledningar och ramp. Rengör tanken med vatten och det rekommenderade tankrengöringsmedlet All Clear Extra™ enligt rekommendationerna. Sköljvattnet sprutas ut över redan behandlad gröda.

Avfallshantering: Rester, spill och ej rengjord tomemballa är farligt avfall och ska destrueras i enlighet med gällande lagstiftning. Rengjord tomemballa (efter minst 3 sköljningar med vatten) och ytteremballage som ej har varit i direkt kontakt med medlet kan lämnas på närmaste återvinningscentral för energiåtervinning. Tom förpackning får inte återanvändas. **Rengjord förpackning kan lämnas till SvepRetur** (www.svepretur.se)

Efterföljande gröda: Bredbladiga grödor kan sås närsomhelst efter normalt skördad gröda eller efter en gröda som behandlats med Select Plus som har gått ut. För sådd av gräsbesläktade grödor (stråsed, vall, majs mm) rekommenderas att vänta 4 veckor efter skörd.

Varningar:

- Förhindra vindavdrift till växter utanför fält, speciellt känsliga gräsbesläktade växter. Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpredda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom
- Insektsangrepp, tidigare ogräsbehandling eller om regn eller frost förväntas eller om grödan är i dålig kondition.
- Ha minst 7 dagar mellan behandling med Select Plus och behandling med andra ogräsmiddel.

Övrigt: Bruksanvisning och rekommendationer är baserade på omfattande försök och fleråriga erfarenheter. Nytt sortmaterial, förändrad odlingsteknik eller uppkommen resistens kan resultera i att preparatet inte ger önskad effekt eller till och med att skador uppstår på grödan. Tillverkaren ansvarar ej för uppkommen skada på grund av sådana förhållanden eller liknande omständigheter, vilka ej kunnat förutses vid preparatets saluförande. Följ alltid rutiner för säkert växtskydd.

Select® är ett registrerat varumärke från Arysta Lifescience.

SELECT® PLUS

HERBICID

Reg.nr.5293 Behörighetsklass 2L. Endast för yrkesmässigt bruk

Godkänd för användning mot gräsgräs i odlingar av jordgubbar, betor, potatis, morötter, huvudkål, lök, lin, raps, rybs, ärter samt i bönor.

All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.

Läs medföljande anvisningar före användning

Innehåll: Produkten innehåller den aktiva substansen kletodim 120 g/l samt även lacknafta (aromhalt >95%, kokpunktsintervall 165-290°C).

Förvaras torrt och frostfritt.

Select® är ett registrerat varumärke från Arysta Lifescience.

Registreringsinnehavare:

Arysta LifeScience S.A.S.
Route d'Artix, BP 80
64150 Noguères
Frankrike

Marknadsföring och distribution:

Nordisk Alkali AB
Krusegatan 19,
SE-212 52 Malmö, Sverige
Tel: +46 (0) 40 6808530
info@nordiskalkali.se



Nordisk Alkali

member of the Belchim Group



5L

7SE1501-0002

1SE0501-0002/A19